

للمهن الطبية فقط



شراب - أقمع

إيبكوفيلين

بيان التركيب:

كل وحدة جرعة تحتوي علي:	شراب ( ٥ مل )	أقمع
أسيفيللين ببرازين	١٢٥ مجم	١٠٠ أو ٥٠٠ مجم

الخواص:

إيبكوفيلين<sup>®</sup> يحتوي علي مادة أسيفيللين، و هي أقل سمية من الامينوفيللين والثيوفيللين، وهي تسبب إرتخاء العضلات الملساء في القصبة الهوائية.

حركية الدواء:

يتم امتصاص مادة أسيفيللين بدرجة طفيفة من القناة الهضمية، وتوزع في أنسجة الجسم، ويتم الإخراج أساسا في البول.

دواعي الاستعمال:

- الربو الشعبي - النزلات الشعبية المزمنة - صعوبة التنفس - الانتفاخ الرئوي

الجرعة وطريقة الاستعمال:

شراب: - البالغين: ٣ - ٥ ملعقة كبيرة يوميا. - الأطفال: ٢ - ٦ ملعقة شاي يوميا.

الرضع (٦ - ١٢ شهر): ١ - ٢ ملعقة شاي يوميا.

أقمع: الأطفال: ١ - ٣ أقمع ١٠٠ مجم يوميا. البالغين: ١ - ٣ أقمع ٥٠٠ مجم يوميا.

التفاعلات الدوائية:

- يجب عدم استعمال الدواء مع ادوية من مجموعة الزانثين.

- مادة أسيفيللين يمكن أن تتفاعل مع مواد أخرى مثل: سيمتيدين، داي سلفيران، المضادات الحيوية كبيرة الجزيء، ثيابندازول، وهيبولاكسين.

الاحتياطات:

يجب استعمال إيبكوفيلين<sup>®</sup> بحذر في حالات الحمل والرضاعة.

موانع الاستعمال:

فرط الحساسية للمستحضر.

الأعراض الجانبية:

نادرا ما تحدث أعراض جانبية مثل الغثيان، القيء، الإسهال، الأرق، الصداع، والدوار.

العبوة:

إيبكوفيلين<sup>®</sup> شراب: قارورة سعة ١٠٠ مليلتر أو ١٢٥ مليلتر.

إيبكوفيلين<sup>®</sup> ١٠٠ مجم أقمع: عبوة بكل منها ٥ أقمع.

إيبكوفيلين<sup>®</sup> ٥٠٠ مجم أقمع: عبوة بكل منها ٥ أقمع.

إن هذا الدواء:

• مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.

• اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك والطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء نفعه وضرره.

• لا تقطع مدة العلاج من لقاء نفسك.

• لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

• لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

الشركة المصرية للصناعات الدوائية

إيبكو

محافظة العاشر من رمضان من ١١٩ المنطقة الأولى ب مصر