برونكوبرو

امبروكسول هيدروكلوريد ١٥ مجم/٥ مل

شراب
منظم للمخاط

التركيب : يحتوى كل ٥ ملليليتر على:-

المواد الفعالة : امبروكسول هيدروكلوريد ١٥ مجم/٥ مللى

المواد الغير فعالة : ميثيل بارهيدروكسى بنزوات ،سوربيتول (غير متبلور)،حامض السيتريك اللامائى،هيدروكسى ايثيل السليلوز،بروبيلين جليكول،جليسرول،نكهة المشمش،نكهة كرامل صناعية،ماء

الخواص :

فى الدراسات قبل الاكلينيكية تبين أن امبروكسول . المادة الفعالة فى **برونكوبرو** . يزيد افراز السبيل التنفسي وهو يحفز انتاج مزيدات التوتر السطحى الرئوية وينبه النشاط الهدبى. وهذه الآثار تؤدى الى تحسين تدفق ونقل المخاط (التصفية المخاطية الهدبية) وقد تبين تحسين التصفية المخاطية الهدبية فى الدراسات الدوائية الاكلينيكية ويؤدى تحسين افراز السائل والتصفيه المخاطية الى تسهيل طرد البلغم وتخفيف السعال .

ما هو برونكوبرو شراب وفيم يتم استخدامه ؟ (دواعى الاستعمال) :

تحريك واذابة الافرازات فى حالات اضطرابات الجهاز التنفسى الحادة والمزمنة المصحوبة بزيادة الافرازات الشعبية وصعوبة فى نقل المخاط .

موانع الاستعمال:

- لا ينبغى استعمال **برونكوبرو** فى المرضى الذين يعرف أن لديهم فرط حساسية للامبركسول او لاى من مكونات المستحضر.

الآثار الجانبية :

القدرة على تحمل **برونكوبرو** شراب جيدة بصفة عامة . وردت تقارير عن آثار معدية معوية علوية بسيطة (التهاب بالمعدة . عسر الهضم . وغثيان وقئ عرضي) وهى تظهر أساسا عند الاستعمال عن طريق الحقن . ظهرت حالات حساسية نادرة وغالبا ما تكون على هيئة طفح جلدى . وفى حالات نادرة جدا ظهرت تفاعلات استهدافية حادة شديدة . ولم تثبت علاقتها باستعمال **برونكوبرو** شراب وقد ظهرت فى بعض هؤلاء المرضى تفاعلات حساسية لمواد أخرى .

الحمل و الإرضاع :

لم تبين الدراسات قبل الإكلينيكية .و أيضا الخبرة الإكلينيكية واسعة النطاق بعد الأسبوع الـ ٢٨. اى دليل على حدوث آثار مناوئة أثناء الحمل ومع ذلك فيجب مراعاة الاحتياطات المعتادة بشان استعمال الأدوية أثناء الحمل خاصة فى الشهور الثلاثة الأولى . والدواء ينفذ إلى لبن الثدي . ولكن من غير المتوقع أن يؤثر على الرضيع عند استعمال الجرعات العلاجية.

التفاعلات الدوائية :

عند إعطاء **برونكوبرو** شراب مع المضادات الحيوية (اموكسيسيللين . سيفيوروكسيم .اريثروماسين . دوكسيسيكلين) فانه يؤدى إلى زيادة تركيز المضاد الحيوي فى النسيج الرئوي . لم ترد تقارير عن أيه تفاعلات سلبية ذات دلالة إكلينيكية بالارتباط مع سائر الأدوية .

الجرعة وطريقة الاستعمال :

شراب (٥ ملليلتر- ملعقة صغيرة):

البالغون والأطفال فوق ١٢ سنه :

شراب ١٥ مجم/٥ملليلتر: ١٠ ملليلتر (٢ ملعقة صغيرة) ٣ مرات يوميا .

لعلاج الإضرابات الحادة بالسبيل التنفسي والعلاج الابتدائي للحالات المزمنة حتى ١٤ يوميا يمكن زيادة الجرعة إلى ٣٠ ملليلتر (٢ ملعقة كبيرة) مرتين يوميا .

لعلاج الأطفال اقل من ١٢ سنه . يوصى بإتباع نظام الجرعة التالي وفقا لشدة المرض :

شراب ١٥ مجم / ٥ ملليلتر .
الأطفال ٦-١٢ سنة : ٥ ملليلتر (ملعقة صغيرة) ٢-٣ مرات يوميا .
الأطفال ٢-٦ سنوات : ٢,٥ ملليلتر (نصف ملعقة صغيرة) ٣ مرات .
الأطفال اقل من سنتين : ٢,٥ ملليلتر (نصف ملعقة صغيرة) مرتين يوميا .

يجب ان يؤخذ **برونكوبرو** **شراب مع الأكل** .

تجاوز الجرعة :

- لم ترد تقارير عن أعراض لتجاوز الجرعة فى الإنسان حتى الآن وتعالج الأعراض فى حالة حدوثها .

تعليمات التخزين :

- يتم التخزين فى مكان امن بعيدا عن متناول ايدى الأطفال
- لا تستعمل الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة .
- يحفظ فى درجة حرارة لا تتعدى ٣٠°م

العبوة : عبوة كرتون تحتوى على ١٠٠ ملى من الشراب فى زجاجة عنبرية اللون (نوع III) مع غطاء محكم الغلق ونشرة داخلية.

(إن هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر .
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

إحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال

اكتوبر
فارما

إنتاج :
شركة **اكتوبر فارما ش.م.م**
مدينة ٦ أكتوبر - ج.م.ع