

# بريستافلام®

١٥ مجم/جم كريم

أسيكلوفيناك ميكرونيزد

يُجرى قراءة هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء؛ فهي تحتوي على معلومات هامة لك.

احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى إذا كان لديك أي أسئلة فاستشر الطبيب أو الصيدلي. تم وصف هذا الدواء لك تحديداً، فلا تعطه لآخرين، فقد يضر بهم، حتى إذا كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعاني أنت منها.

إذا حدث لديك أي آثار جانبية، فاقصل بالطبيب أو الصيدلي، حتى إذا كانت هذه الآثار الجانبية غير مدرجة في هذه النشرة.

محتويات هذه النشرة:

1. ما هو بريستافلام؟ وفيه يُستخدم.
2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل البدء في استخدام بريستافلام.
3. كيفية استخدام بريستافلام.
4. الآثار الجانبية المحتملة.
5. كيفية تخزين بريستافلام.
6. محتويات العبوة ومعلومات إضافية.

**ما هو بريستافلام؟ وفيه يُستخدم؟**  
كريم بريستافلام ١٥ مجم/جم هو نواء للاستخدام على الجلد، يحتوي على غدار أسيكلوفيناك الذي يمتلك نشاطاً مسكناً للألم ومضاداً للالتهاب والرومانيزم.

يسبب لك طبيبك هذا الدواء؛ لعلاج الالتهابات الموضعية المؤلمة مثل: التهاب الوتر والتهاب عمق الوتر والانتواء وآلم وخلوع المفاصل وآلم الفظني وتيبس الرقبة.

ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل البدء في استخدام بريستافلام

لا تستخدم بريستافلام في الحالات الآتية:  
- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أسيكلوفيناك أو مضادات الالتهاب الأخرى أو أي من المكونات الأخرى بهذا الدواء (المذكورة في قسم ٦).

إذا تسبب الأسبيرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى في حدوث ربو أو التهاب بالأنف أو شرى (ارتكاريا)، أو أي تفاعلات حساسية أخرى لك.

تحذيرات واحتياطات:

المخاطر المتعلقة بالجهاز الهضمي:  
تؤدي العقاقير المضادة للالتهاب غير الستيرويدية إلى مخاطر متزايدة للآثار الجانبية بالجهاز الهضمي ومنها:

الالتهابات والنزيف والقرحة والانتفاخ المعدة أو الأمعاء وقد تكون مميتة. يمكن أن تقع هذه الحالات في أي وقت أثناء العلاج وتكون أعراض متفرقة. المرضى من كبار السن هم الأكثر عرضة للأعراض الجانبية الخطيرة بالجهاز الهضمي.

المخاطر المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية:  
يمكن أن تؤدي العقاقير المضادة للالتهاب غير الستيرويدية إلى زيادة احتمالات حدوث جلطات قلبية وعائية خطيرة واحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية، والتي قد تكون مميتة. وهذه المخاطر قد تزداد مع طول فترة الاستخدام.

إن المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو لديهم عوامل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يكونون أكثر عرضة لهذه المخاطر.

يحظر استخدام العقاقير المضادة للالتهاب غير الستيرويدية في علاج الآلام التي تلي العمليات الجراحية لتحويل مسار الشريان التاجي.

استشر الطبيب أو الصيدلي أو المعرّض الخاصين بك قبل البدء في استخدام بريستافلام:

لا تستخدمه في العينين أو على الأغشية المخاطية أو الجروح المفتوحة

لا تستخدمه إذا كان هناك تهيج في موضع العلاج، يجب عدم تعريض المناطق التي يتم علاجها لضوء الشمس (حتى إذا كانت غائمة) أو مصابيح الأشعة فوق البنفسجية.

لا تستخدمه مع المضادات الفعّالة التي لا تسمح بتعرض الجلد للهواء بشكل مناسب.

إذا لاحظت احمراراً أو إصابة في موضع العلاج، فتوقف عن استخدام الدواء على الفور واتصل بطبيبك.

نادراً جداً ما تحدث تفاعلات فرط الحساسية ولكنها تكون خطيرة جداً (انظر قسم ٤ الآثار الجانبية المحتملة). يبلغ خطر حدوث مثل هذه التفاعلات ندرته خلال الشهر الأول من العلاج. فم يبقيا العلاج على الفور مع أول ظهور لأعراض جلدية أو إصابات مخاطية أو علامات أخرى لفرط الحساسية.



في حالة الإصابة بالحمق (الجديري المائي)، فيجب عليك تجنب استخدام هذا الدواء؛ لأنه في حالات نادرة قد تصاحبه عدوى جلدية شديدة.

استخدام بريستافلام مع الأدوية الأخرى

أخبر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً، أو قد تحتاج لاستخدام أي أدوية أخرى.

يكون لذلك أهمية خاصة إذا كنت تتناول ليتيوم، وديجوكسين، ومدرات البول، ومضادات التخثر ومسكنات الألم.

الحمل والرضاعة

إذا كنتِ حامل أو مرضعة، أو تعتقدن أنك حامل أو تخطئين للحمل، فاقصلي باستخدام أو الصيدلي الخاص بك قبل استخدام هذا الدواء.

القيادة واستخدام الآلات

لا توجد هناك أي تأثيرات على القدرة على قيادة المركبات أو استخدام الآلات عند استعمال أسيكلوفيناك على الجلد من الخارج.

كيفية استخدام بريستافلام

اتبع جميع تعليمات استخدام هذا الدواء؛ التي قدمها لك الطبيب أو الصيدلي الخاص بك، في حالة الشك، يُجرى استشارة الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

سبيلتك طبيبك بعدد مرات الاستخدام والتكرار ومدة العلاج اللازمة بوجه عام. يتم وضع من ١.٥ إلى ٢ جرام (من ٥ إلى ٧ سم تقريباً) على المنطقة المصابة ثلاث مرات يومياً مع التدليك برفق.

الاستخدام في الأطفال

غير موصى به إذا استخدمت كمية من بريستافلام أكثر مما يجب في حالة ابتلاع الكريم دون قصد، اذهب على الفور إلى أي مركز طبي.

الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، قد يسبب بريستافلام آثاراً جانبية، على الرغم من أنها لا تحدث لدى الجميع. وبشكل استثنائي، تمت ملاحظة عدوى جلدية شديدة أثناء الإصابة بالحمق (الجديري المائي).

في حالات نادرة (قد تؤثر في ما يصل إلى ١ من كل ١٠٠ شخص)، كنتيجة للحساسية غير الكافية لمناطق الجلد المُعالَجة، كانت هناك تقارير عن حدوث تفاعلات حساسية بسبب التعرض الشديد لضوء الشمس، وتهيج واحمرار وحكة في موضع الاستخدام، والتي تختفي عند التوقف عن استخدام الكريم.

في حالات نادرة جداً (قد تؤثر في ما يصل إلى ١ من كل ١٠.٠٠٠ شخص) كانت هناك تقارير عن حدوث تفاعلات، تشمل ظهور بثور شديدة على الجلد تشبه متلازمة ستيفنز جونسون، وتحلل البشرة التحري التسممي. إذا كنت تعاني من أي من هذه الآثار الجانبية، فاقصل بالطبيب أو الصيدلي أو المعرّض الخاصين بك، حتى إذا لم تكن تلك الآثار الجانبية مذكورة في هذه النشرة.

كيفية تخزين بريستافلام

يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن رطوبة ومتناول الأطفال. يُخزّن في درجة حرارة الغرفة.

لا تستخدم هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة بعد الأحرف "EXP". بشر تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم من ذلك الشهر.

محتويات العبوة ومعلومات أخرى

تركيب بريستافلام  
المكون الفعال هو أسيكلوفيناك، يحتوي كل ١٠٠ جرام من الكريم على ١.٥ جرام أسيكلوفيناك ميكرونيزد.

المكونات الأخرى: بروبيل بارابين، ميثيل بارابين-زيت معدني، إيثانول بارابين، قاعدة (EWA) وماء مني.

شكل المنتج الدوائي ومحتويات العبوة  
عبوة تحتوي على ٣٠ جرام كريم؛ نشرة داخلية.

إنتاج

سميثكلان بيتشام - الهرم - الجيزة.

