



جاستروموتيل

أقراص و معلق و أقماص

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك مشكلة أخرى، إسأل طبيبك أو الصيدلي.
- هذا الدواء تم وصفه خصيصاً لك، لذلك يجب عدم إعطاء الدواء إلى أي شخص آخر، لأن الدواء يمكن أن يضره، حتى لو كان لديه نفس الأعراض التي لديك.
- يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي فور ملاحظة أن الأعراض الجانبية تزداد سوءاً أو عند حدوث أعراض جانبية غير متوقعة.

في هذه النشرة،

1. ما هو جاستروموتيل و فيما يستخدم؟
2. قبل إعطاء جاستروموتيل
3. كيف تأخذ جاستروموتيل؟
4. ما هي الأعراض الجانبية المتوقعة؟
5. كيف يتم تخزين جاستروموتيل؟
6. معلومات إضافية.

1. ما هو جاستروموتيل و فيما يستخدم؟

اسم الدواء هو جاستروموتيل. إن المدة الفعالة من هذا الدواء هي دوميبريدون، الذي ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى "مضادات الدوبامين". يعمل دوميبريدون عن طريق المساعدة في نقل الطعام بشكل أسرع من خلال أنبوب الغذاء (الزوم) المعدة والأمعاء؛ وهذا حتى لا يبقى في قسم المكان لفترة طويلة جداً. كما أنه يساعد على وقف تدفق الطعام ببطءة وخاصة عند الإصابة بحالة عسر الهضم. لا تأخذ جاستروموتيل إذا كنت تعاني من انسداد في الأمعاء، يمكن استخدام دوميبريدون فيما يلي:

- الكبار: لوقف أو منع الشعور بالغثان أو التقيؤ.
- الأطفال: لوقف أو منع الشعور بالغثان أو التقيؤ.

2. قبل إعطاء جاستروموتيل،

- لا تأخذ جاستروموتيل إذا كنت:
- لديك حساسية (مفرطة) من دوميبريدون أو أي من المكونات الأخرى للمنتج. إن علامات تفاعلات الحساسية تتضمن: طفح جلدي، مشاكل في البلع أو التنفس، تورم الشفاه، الجنبرة، الوجه أو اللسان.
- لا تأخذ هذا الدواء لمدة أكثر من إسبوع واحد.
- لديك تورم في العنق التشنجية (وزم بوليكيني).
- لديك انسداد أو تورم في الأمعاء.
- لديك سواد، تقيؤ أو حرركات الأمعاء (البراز) أو وجود دم في حرركات الأمعاء. هذا قد يكون علامة عن حدوث تزيب في الأمعاء.

لا تأخذ بشكل متزامن كيتوكونازول، إريثروميسين أو غيرها من المضادات الفوية لإزيمات CYP3A التي تعطل الفترة الزمنية بين التوجه كيو والموجة في مثل فلوكونازول، فوريكونازول، كلازيتروميسين والأمودادون.

(مقابل من قصور متوسطاً أو شديد في وظائف الكلى أو الكبد أو إيقاع القلب، أو إذا كان لديهم من خطر متزايد من تعاقب تزيب في النشاطات و التشنجات و التشنجات الكهرلية في القلب أو إيقاع القلب، أو إذا كان لديهم من خطر متزايد من الإصابة بهذه الأعراض.

لا تأخذ أدوية أخرى لها تأثير مماثل على القلب أو تنقل من تكبير دوميبريدون في الجسم (ويتألى زيادة خطر حدوث الأعراض الجانبية).

لا تأخذ جاستروموتيل إذا كان أي من الحالات السابقة تنطبق عليك، إذا كنت غير متأكد، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ جاستروموتيل.

يجب لوقني احتفظ بجرعة واحدة من الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام جاستروموتيل إذا كنت:

- لديك أي مشاكل في الكلى، إذا كنت تأخذ جاستروموتيل لفترة طويلة، قد يربط طبيبك في خفض الجرعة. وهذا يعتمد على مدى شدة المشاكل التي لديك في الكلى.
- لديك مشاكل في الكبد.
- إذا كنت غير متأكد ما إذا كنت أي من الحالات السابقة تنطبق عليك، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ جاستروموتيل حتى لو كانت أي من الحالات السابقة كانت تنطبق عليك في الماضي.

جاستروموتيل الأقراص و معلق، قد يصاحب إستخدام دوميبريدون زيادة في إمكانية الإصابة بعدم إنتظام حد في صدرات البلعوس أو موت قلبى مفاجئ، وبخاصة في المرضى الذين يتناولون جرعات يومية أكبر من ٦٠ مجم، والمرض الكبار أكثر من ٦٠ سنة.

يجب على البالغين أخذ أقل جرعة ممكنة من جاستروموتيل.

إن إمكانية الإصابة بأعراض جانبية عصبية أعلى في الأشهر الأولى من الحياة حيث تكون وظائف الأبنس للهاجز الدمى في المخ لم تتطور بشكل كامل، لذلك تظهر الآثار الجانبية العصبية بصورة أكبر في الأطفال الصغار.

جاستروموتيل المعلق، قد يصاحب إستخدام دوميبريدون زيادة في إمكانية الإصابة بعدم إنتظام حد في صدرات البلعوس أو موت قلبى مفاجئ، وبخاصة في المرضى الذين يتناولون جرعات يومية أكبر من ٦٠ مجم، والمرض الكبار أكثر من ٦٠ سنة.

يجب على البالغين أخذ أقل جرعة ممكنة من جاستروموتيل.

إن إمكانية الإصابة بأعراض جانبية عصبية أعلى في الأشهر الأولى من الحياة حيث تكون وظائف الأبنس للهاجز الدمى في المخ لم تتطور بشكل كامل، لذلك تظهر الآثار الجانبية العصبية بصورة أكبر في الأطفال الصغار.

تناول أدوية أخرى:

يجب عليك إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أدوية أو تناولت مؤخرًا بعض الأدوية، بما في ذلك الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة. وهذا لأن دوميبريدون يمكن أن يؤثر على طريقة عمل بعض الأدوية وبعض الأدوية يمكن أن تؤثر على دوميبريدون.

- لا تأخذ جاستروموتيل وأجبر طبيبك إذا كنت تأخذ أي من الأدوية التالية:
- كيتوكونازول والأقراص أو سائل لعلاج العدوى الفطرية.
- المضادات الحيوية لعلاج العدوى (مثل الأزيثروميسين).
- الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية (مثل زيتوفافير).

لا تلمس جاستروموتيل أقراص الأطفال الذين يقل وزهم عن ٢٥ كجم.

الحمل والرضاعة الطبيعية:

تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ جاستروموتيل إذا كنت:

- حاملًا، قد تصبح حاملًا أو تعتديين أنك حاملًا.
- خلال فترة الرضاعة الطبيعية، فمثل عدم أخذ جاستروموتيل إذا كنت خلال فترة الرضاعة الطبيعية، وذلك لأن كميات صغيرة قد تنتقل إلى لبن الأم.

الزيادة أو العمل أمام المكينات:

قد تشعر بنعاس، إرتباك أو أقل سيطرة على حرركاتك أثناء أخذ جاستروموتيل. إذا حدث هذا، يجب عدم القيادة أو العمل أمام المكينات.

معلومات عامة حول بعض العناصر الموجودة في جاستروموتيل

إن جاستروموتيل الأقراص يحتوي على لاكتوز. لذلك يجب إخبار الطبيب قبل أخذ جاستروموتيل إذا كنت لا تستطيع تحمل بعض السكريات.

إن جاستروموتيل معلق يحتوي على سورتول، إذا كنت لا تستطيع تحمل أو تحمل بعض السكريات. تحدث مع طبيبك قبل أخذ جاستروموتيل، كما يمكن أن يسبب السورتولين دم في البراز.

إن جاستروموتيل الساق يحتوي على بورتولاند، هيدروكسي أميسول الذي يمكن أن يسبب هياج للعين، الجلد، والمرات الداخلية للحمم (مثل القم والأف).

3. كيف تأخذ جاستروموتيل؟

يجب دائماً تناول الدواء طبقاً لتعليمات الطبيب، وإذا لم تكن متأكدًا، إستشير الطبيب أو الصيدلي. كيفية أخذ هذا الدواء:

يجب أخذ الأقراص والأقماص عن طريق الفم والأقماص في فتحة الشرج.

يجب بلع الأقراص من كوب من الماء.

يجب تناول جاستروموتيل قبل الأكل بموالات ١٥ - ٣٠ دقيقة وعند الضرورة قبل النوم.

يجب عدم سحق أو مضغ الأقراص.

يجب عدم استخدام جاستروموتيل لأكثر من إسبوع واحد.

كيفية أخذ الأقماص:

- يوصى بالآسق للعين.
- خذ شريط الأقماص و إضعل أحد الأقماص من الشريط.
- إزغ القماص، الأريثريك من الطرف المنب.
- إستخرج القمع كل دفع القمع بلطف عن فتحة الشرج باستخدام إصبعك.
- إدفع القمع لأبعد مسافة ممكنة.
- شد عضلات المعدة حتى يفتح القمع في الخرج.
- إضعل يدك بعد الانتهاء.
- الجرعة المعتادة هي:

- البالغين والمرافقين (الذين يزيد وزهم عن ٣٥ كجم)،
- الأطفال: ١٠ مجم ٣ مرات يوميًا،
- الأقماص: ٢٠ مجم مرتين يوميًا.
- الأطفال والمرافقين (الذين يقل وزهم عن ٣٥ كجم)،
- ستقوم الطبيب بتحديد الجرعة المناسبة لوزن طفلك، ٢٥ - ٣٥ مجم كجم عن طريق الفم ٣ مرات يوميًا. يجب عدم إعطاء جاستروموتيل أقراص للأطفال الذين يقل وزهم عن ٢٥ كجم.

المرض الحساسون بمشاكل في الكلى:

يمكن أن يعطيك الطبيب جرعة أقل أو أخذ عدد جرعات أقل.

المرض الحساسون بمشاكل في الكبد:

لا يجب أن يعطى جاستروموتيل للمرضى الذين يعانون من قصور متوسط أو شديد في وظائف الكبد.

إنني ممن يتناول هذه الدواء:

فليطبك هو المسئول عن تحديد أي من يجب أخذ هذا الدواء.

إذا كنت تأخذ جاستروموتيل لأكثر من ١٤ أسابيع، قد يربط طبيبك في زويتك مرة أخرى، وهذا لمعرفة ما إذا كنت بحاجة لإستمرار أو الحد الملاج لـ ١٤.

عند تناول جرعة أكبر من المطلوب:

إذا أخذت جرعة أكبر من الموصوفة لك، تحدث إلى الطبيب أو إذهب إلى أقرب مستشفى على الفور وخذ

معدك ما تبقى من الدواء، وذلك حتى يعلم الطبيب ماذا أخذت.

إن العلامات التي تظهر عند تناول جرعة أكبر من الموصوفة لك تشمل: الشعور بالنعاس، إرتباك، حرركات غير منتظمة (خاصة عند الأطفال) والتي تشمل حرركات غير طبيعية في للعين، حرركات غير طبيعية للسان أو وضع غير طبيعي (مثل التواء الرقبة).

عند نسيان تناول إحدى الجرعات:

إذا نسيت تناول إحدى الجرعات، خذ الجرعة فور تذكرها إلا إذا كان ميعاد الجرعة القادمة قد حان.

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة النسيه.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن كيفية إستخدام هذا المنتج - إسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. ما هي الأعراض الجانبية المتوقعة؟

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب جاستروموتيل بعض الأعراض الجانبية، بالرغم من أنه ليس على جميع المرضى الإصابة بهذه الأعراض.

توقف عن تناول جاستروموتيل وتحدث إلى الطبيب أو إذهب إلى المستشفى على الفور إذا:

- حدث تورم في العينين، القدمين، الكاحلين، الوجه، الشفاه أو الحلق مما قد يسبب صعوبة في البلع أو التنفس، ويمكن أن تلاحظ أيضًا حمى، طفح جلدي قشري (أرتيكاريا) أو طفح قرصاس، وهذا قد يعنى أنك لديك تفاعلات حساسية من دوميبريدون.
- لاحظت حدوث حرركات غير طبيعية، وتشمل حرركات غير طبيعية للعين، حرركات غير طبيعية للسان، أو وضع غير طبيعي مثل التواء الرقبة، إرتباك وتصلب العضلات، وهذا على الأرجح يحدث في الأطفال. ينبغي أن توقف هذه الأعراض بمجرد التوقف عن تناول دوميبريدون.

- الأعراض الجانبية الأخرى التي تشمل ما يلي:
- نهار (يؤثر في أقل من شخص في كل ١٠٠٠ شخص):
- إرتباك غير طبيعي لإحليل الذي لدى الرجال والنساء.
- تضخم الثدي لدى الرجال.
- إلتفاف الساع، اللداع الجنسي (الزينة) في الرجال.
- بالنسبة للنساء، قد تكون فترة الحيض غير منتظمة أو قد تتوقف.
- مشاكل بالدمع شاملة لتلصقات بسيطة بالدمع.
- لادرية جدا (يؤثر في أقل من شخص في كل ١٠٠٠٠ شخص):
- حمى وقد تصاحب بطفح جلدي.
- تضخم التي أجريت على الدم تظهر تغير في عمل الكبد.
- صداع.
- الشعور بهياج.
- عصبية زائدة عن الحد الطبيعي.
- تشنج.
- الشعور بدوخة.

إن الأعراض مثل الشعور بالدوخة، العصبية أو الإصابة بشننج تحدث بشكل أكبر في الأطفال.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي فور ملاحظة أن الأعراض الجانبية تزداد سوءاً أو مستمرة لفترة طويلة أو عند حدوث أعراض جانبية غير متوقعة.

5. كيف يتم تخزين جاستروموتيل؟

الأقراص مغلقة تحفظ عند درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠°م.

المعلق، يحفظ عند درجة حرارة لا تزيد عن ٢٥°م.

الأقماص، تحفظ عند درجة حرارة من ٢°م - ٨°م.

يحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

يجب عدم أخذ جاستروموتيل بعد إنتها تاريخ الصلاحية المكتوب على العلبة، ويشير تاريخ إنتها الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر المذكور.

يجب عدم التخلص من الدواء عن طريق مياه المجارى أو عن طريق القمامة. ويجب إستشارة الصيدلي عن كيفية التخلص من الدواء غير المستخدم، والهدف من ذلك المحافظة على البيئة نظيفة.

6. معلومات إضافية:

مما يتكون جاستروموتيل؟

المادة الفعالة: دوميبريدون.

كل قرص معلق يحتوي على: ١٠٠ مجم دوميبريدون (على هيئة أملاح).

كل ١٠٠ مل يحتوي على: ١٠٠ مجم دوميبريدون.

كل قمع يحتوي على: ٢٠ مجم دوميبريدون.

المواد غير الفعالة:

الأقراص المعلقة: لاكتوز أحادي المائي، ميكروكستالات الميليزول، نشا جليكولات الصوديوم، ثنائي أكسيد السيليكون الكولوني، بوليبيون ك-٣٠، صوديوم بوليول سلفات، مانغنيوم سترات،

معلق: ميكروكستالات الميليزول، صوديوم كاربوكسي ميثيل سلولوز، محلول السوربيتول ٧٠، ميشل براون، بوليبيول براين، بولي سوربات ٨٠، هيدروكسيد الصوديوم، ماء نقي.

الدواء معون جاهزة: بوليولات هيدروكسي إنيثول، البروسول ٢٠، بولي سوربات ٨٠.

الصيدلي

جاستروموتيل أقراص مغلقة، شرائط بكل منها ١٠٠ قرص.

جاستروموتيل معلق، زجاجة ١٠٠ مل (تحتوى على ١٠٠ ملغ من الدواء III).

جاستروموتيل أقماص، علبة تحتوي على ٤ أقماص.

الشركة المسيرة الأدوية للصناعات الدوائية