



دومبيدون

أقراص - معلق للشرب

التركيب :

أقراص : دومبيدون ١٠ مجم / قرص
معلق للشرب : دومبيدون ١ مجم / مليلتر

الخواص :

دومبيدون مضاد لإفراز الدوبامين ورغم ان له خواص مماثلة للميتوكلوراميد هيدروكلوريد إلا أنه أكثر فاعلية في حالات عسر الهضم وماتع للقيء وأقل أعراض جانبية من الميتوكلوراميد في التأثير على النظام خارج الهرمي ، دومبيدون يتميز عن الميتوكلوراميد في السيطرة على الدوار والقيء في كل من الكبار والأطفال وفي علاج اضطرابات الجهاز الهضمي التي تصاحب تعاطي أدوية الشلل الرعاش.

دواعي الإستعمال :

- لعلاج الدوار الحاد والقيء - فرحة المعدة - ظاهرة تهيج المصران - إرتجاع المعدة والمرئ
- يمنع أزمات الصداع النصفي - عسر الهضم المزمن والذي يحدث بعد الأكل
- وكذلك في حالات الدوار والقيء الناتج عن تعاطي ليفودوبا أو بروموكربتين في حالات الشلل الرعاش

الأعراض الجانبية :

- يعتبر دومبيدون جيد التحمل في معظم الحالات التي تم دراستها حتى اليوم .
- بعض الأعراض العصبية القليلة المتصاحبة لعقار دومبيدون .
- الآثار الجانبية تشمل جفاف الفم - حكة مؤقتة بالجلد - صداع - عطش - إسهال .
- بعض حالات الوهن ظهرت في ١ ٪ من البالغين عند علاجهم بميتوكلوراميد لفترة قصيرة ولكن نادراً ما تظهر مع دومبيدون عند علاجهم بنفس الجرعات .
- نادراً ما يحدث التأثير على النظام خارج الهرمي في الأطفال عند علاجهم بدومبيدون.

تحذيرات واحتياطات :

- لا يستعمل دومبيدون في المرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكبد أو الكلى .
- لا يستعمل دومبيدون في حالات إندساد المعدة والأمعاء أو وجود نزيف بهما .
- يستعمل في حالات الشلل الرعاش لمدة لا تزيد عن ١٢ أسبوع فقط .
- يجب الأخذ في الإعتبار أن دومبيدون قد يصل إلى الدورة الدموية للمخ لذا هناك خطورة من الأعراض المركزية .
- يجب استعماله فقط في حالات الشلل الرعاش عندما تفشل الأدوية الأخرى المعالجة للقيء .
- لا يعطى دومبيدون معلق للشرب للمرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكبد أو الكلى حيث أنه يحتوي على بروبيلين جليكول في مكوناته.

طريقة الاستعمال والجرعة :

١- الأقراص :
- حالات الدوار والقيء : من ١٠ مجم إلى ٢٠ مجم ثلاث مرات يومياً .
- إرتجاع المعدة والمرئ :
* التهاب المعدة المزمن : تعطى جرعة ٣٠ مجم حتى تعطي التأثير المطلوب .
* إرتجاع المرئ : لا بد ان تعطى جرعة ٢٠ مجم أربع مرات يومياً .
- حالات اضطراب المصران : تعطى جرعة ١٠ مجم ثلاث مرات يومياً .
- حالات سوء الهضم المزمن بعد الأكل : الجرعة المعتادة للكبار هي ١٠ مجم ثلاث مرات يومياً تأخذ من ١٥ إلى ٣٠ دقيقة قبل الوجبات وفي الحالات الضرورية تعطى أيضاً قبل النوم .
- حالات فرحة المعدة : تعطى جرعة ٢٠ مجم ثلاث مرات يومياً قبل الوجبات .

٢- معلق للشرب للأطفال :

١- حالات سوء الهضم المزمن :
٢,٥ مليلتر لكل ١٠ كيلوجرام من وزن الطفل ثلاث مرات يومياً قبل الأكل وإذا لزم الأمر تأخذ جرعة قبل النوم .
إذا لم تعطي هذه الجرعات نتائج إيجابية فإنه يسمح بمضاعفة الجرعات السابقة للأطفال الذين أكبر من سن سنة في العمر .
٢- حالات الغثيان والقيء :
٥ مليلتر لكل ١٠ كيلو جرام من وزن الطفل ثلاث مرات يومياً قبل الأكل وإذا لزم الأمر تأخذ جرعة قبل النوم .

العبوة :

الأقراص : غلبه بها ٣٠ قرص أو ١٠٠٠ قرص في شرائط
معلق للشرب : عبوات زجاجية بها ١٠٠ مليلتر و ٢٠٠ مليلتر

الدواء مستحضر طبي يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
لا تكرر تناول الدواء إلا بتعليمات من الطبيب.
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالوج العرب

