

للمهن الطبية فقط  
**سولفين أن شراب**  
هيدروكلوريد البرومهكسين  
مذيب للبلغم الشعبي

**التزكيب:**

كل ١٠٠ مليلتر تحتوى على :

هيدروكلوريد البرومهكسين ٨٠ مجم

**الخواص:**

سولفين أن شراب ذو أثر فعال على إذابة البلغم الشعبي حيث يقلل هيدروكلوريد البرومهكسين لزوجة البلغم ويسهل طرده.

سولفين أن شراب يسيل البلغم الشعبي اللزج مع زيادة حجم البصاق مما يسمح بطرد الإفرازات اللاصقة بالشعب مما يؤدي إلى سهولة التنفس.

ان البرومهكسين ليس له تأثير منبسط على الجهاز التنفسي وليس له تأثير مسكن ولكنه مخفض للسعال وطارد للبلغم.

ان هيدروكلوريد البرومهكسين يمتص جيدا بعد تناوله عن طريق الفم وهو جيد الاحتمال، ويبدأ المفعول بعد ٣٠ دقيقة من تناوله ويبقى لمدة تتراوح من ٦-١٢ ساعة.

سولفين أن شراب مفيد في علاج أمراض القناة التنفسية المصحوبة باحتباس إفراز البلغم.

**دواعى الاستعمال:**

لعلاج ومنع الإفرازات فى الأمراض الحادة والمزمنة من التهابات الشعبية الرئوية المصحوبة بلزوجة فى البلغم مثل الإلتهاب الشعبى، إلتهاب القصبى الشعبى والإمفيزيما المصحوبة بالنزلة الشعبية.

**الجرعة:**

البالغين والأطفال فوق ١٢ سنة : ٢ ملعقة شاي (١٠ مليلتر) ٢-٣ مرات يوميا.

الأطفال حتى سنتان : ١/٢ ملعقة شاي (٢,٥ مليلتر) مرتان يوميا.

الأطفال من سنتان حتى ٥ سنوات: ١/٢ ملعقة شاي (٢,٥ مليلتر) ٣ مرات يوميا.

الأطفال أكبر من ٥ سنوات : ١/٢ ملعقة شاي (٥ مليلتر) ٢-٣ مرات يوميا.

**ملحوظة:**

إذا كان المريض يعاني من خلل فى وظائف الكلى أو أمراض خطيرة بالكبد يجب أن تزداد المدة بين مرات التعاطى أو تقلل الجرعة من مستحضر سولفين أن شراب.

**دواعى عدم الاستعمال:**

- لا يستعمل هذا الدواء فى الأشخاص الذين لديهم حساسية للبرومهكسين أو أى من مكوناته.

- لا يستعمل البرومهكسين أثناء الحمل والرضاعة إلا إذا أقررت الطبيب المعالج تناوله إذا دعت الضرورة لذلك.

- فى بعض أمراض الشعب الرئوية النادرة المصاحبة بزيادة تراكم الإفرازات مثل (أعراض سرطان الخلايا الهدبية) يجب أن يؤخذ سولفين أن فقط بحذر وباستشارة طبية وذلك بسبب قوة احتقان الإفرازات.

**الأثار الجانبية:**

الأثار الجانبية على الجهاز الهضمى (مثل الغثيان، آلام فى المعدة) حساسية الجلد والغشاء المخاطى، ضيق فى التنفس، ارتفاع فى درجة الحرارة مصحوبة بقشعريرة قد تحدث فى حالات نادرة.

ارتفاع مؤقت فى مستوى الأمينوترانسفريز قد يظهر أحيانا.

بالإضافة إلى أنه نادرا ما يحدث بعد تناول البرومهكسين جفاف فى الفم والمصالك التنفسية، زيادة اللعاب، زيادة إفراز المخاط من الأنف، الإمساك، ألم فى التبول.

**الإحتياطات:**

يجب أن يعطى البرومهكسين بحذر للمرضى الذين يعانون من قرحة بالمعدة إذ أنه قد يؤدي إلى تمزق الغشاء المبطن لجدار المعدة.

**زيادة الجرعة والعلاج:**

زيادة الجرعة قد يؤدي إلى إتهابات موضعية مثل إتهاب الحلق الموضعى، ألم فى المعدة، غثيان، قي وإسهال.

ان العلاج الأولى هو إحدث فى وتناول سوائل (مثل الماء والشاي).

استشر الطبيب المعالج وقد يحتاج الأمر لإزالة الجرعة الزائدة من البرومهكسين من المعدة بعمل غسيل للمعدة خلال الساعتين الأولى من تناول الجرعة الزائدة مع ملاحظة انتظام الدورة الدموية.

**العبوة:**

زجاجات تحتوى على ٦٠ مليلتر، ١٢٠ مليلتر من الشراب

**ملحوظة:**

سولفين أن شراب خالى من الكحول.

يجب أن يحفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.

يحفظ عند درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ م.



إنتاج الشركة العربية للأدوية  
القاهرة ج. م. ع.