

فاركو تيليام

كبسولات ومعلق
وأقمار للكبار

منظم لحركة المعدة

ومضاد للتشنج

التركيب:

تحتوي كل تركيبة على: ١٠ كبسولة / ٥ مجم / ٥ مل معلق / ٦٠ مجم قمع للكبار

الأثر الطبي:

كبسولات ومعلق وأقمار فاركو تيليام تحتوي على مادة دومبيريدون ذات الفعالية العالية لمنع التشنج والغثبان وعلاج الأعراض المصاحبة لارتجاع عصارة المعدة إلى المرئ نتيجة عدم تفرغ المعدة لاحتوائها. ويعمل فاركو تيليام من خلال التأثير المباشر على مستقبلات دوپامين الطرفية مما يؤدي إلى تقوية عضلة فتحة المرئ السفلى وزيادة حركة عضلات المعدة وتسهيل إنتقال محتويات المعدة إلى الأمعاء ومنع ارتجاعها إلى المرئ. ومن الناحية الإكلينيكية فإن استعمال فاركو تيليام يؤدي سريعاً إلى منع التشنج والقضاء على الشعور بالغثبان كما يزيل سريعاً الأعراض التي تصاحب اضطرابات الحركة العضلية بالمعدة والأمعاء الدقيقة مثل الشعور بالانتفاخ وحرقان في المعدة وغيرها من أعراض سوء الهضم. ومستحضرات فاركو تيليام مأمونة الاستعمال ولا تؤثر على إفرازات القناة الهضمية أو حركة التبولين لذا فإنها لا تسبب الإسهال. كما أن فاركو تيليام لا يسبب أية تأثيرات جانبية على الجهاز العصبي لأنه لا ينفذ عبر أغشية المخ مما يجعله أكثر أماناً من الكثير من الأدوية الأخرى المضادة للتشنج وتوافر فاركو تيليام على هيئة كبسولات أو معلق أو أقمار (للكبار) يفس باحتياجات العلاج ويتناسب مع الحالات المختلفة في كل الأعمار.

حركية الدواء:

تمتص مادة دومبيريدون سريعاً من القناة الهضمية ويتم أبيض الدواء في جدار الأمعاء والكبد. ويصل أعلى تركيز له في الدم خلال ٢٠ دقيقة من تناول الدواء عن طريق الفم وبعد حوالي ساعة من استعمال الأقمار. وينتشر دومبيريدون في معظم أنسجة وسوائل الجسم باستثناء الجهاز العصبي المركزي. وتبلغ نسبة الارتباط ببروتينات الدم أكثر من ٩٠٪ ويتحول الدواء في الكبد إلى نواتج أفضية تخرج من الجسم عن طريق البول والبراز، وتبلغ فترة نصف العمر للدواء في الدم حوالي ٢.٥ ساعة.

دواعي الاستعمال:

- منع وعلاج التشنج والقضاء على الشعور بالغثبان كما في الحالات الآتية:

- العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.
- التهاب المعدة والكبد والبنكرياس.
- عسر الطمث.
- تضيق حركة القناة الهضمية والقضاء على اضطراباتها كما في الحالات الآتية:
- الانتفاخ والانتفاخ وحرقان في المعدة من جراء سوء الهضم (في حالات عدم وجود قرحة بالمعدة).
- ارتجاع محتويات المعدة إلى المرئ.
- اضطرابات حركة القناة الهضمية المصاحبة لمرض البول السكري وبعض الأمراض العصبية.

- بعد العمليات الجراحية لمنع التشنج والغثبان.

الجرعة:

يجب تناول الكبسولات والمعلق قبل الأكل بحوالي ١٥-٢٠ دقيقة وقبل النوم إذا استدعت الحالة.

المقاوم:

الكبسولات: ٢-١ كبسولة (١٠ - ٢٠ مجم) ٢ - ٣ مرات يومياً .

المعلق: ٢-٤ ملعقة صغيرة (١٠ - ٢٠ مجم) ٢ - ٣ مرات يومياً .

الأقمار: قمع واحد كل ٨ ساعات.

الأطفال:

٢ - ٤ سنوات: ١ - ٢ مجم / كجم من وزن الجسم كل ٤ - ٨ ساعات.

موانع الاستعمال:

الحساسية المفرطة لمادة دومبيريدون.

الاحتياطات:

يستعمل دومبيريدون بحذر في مرضى قصور وظائف الكلى.

الأعراض الجانبية:

فاركو تيليام مأمون الاستعمال ونادراً ما يحدث جفاف بالفم وصداق وأحمرار بالوجه وارتفاع طفيف بمستوى البرولاكتين بالدم.

الحمل والرضاعة:

لم تظهر الدراسات المعملية على الحيوانات أية أضرار على الجنين لكن يجب

استخدام دومبيريدون أثناء الحمل تحت إشراف الطبيب وقد يساعد دومبيريدون على زيادة إفراز اللبن عند السيدات أثناء

الرضاعة ويظهر في لبن الأم بكميات ضئيلة ليست لها أية أضرار على الرضيع.

التداخلات الدوائية:

يقلل دومبيريدون من تأثير بروموكريبتين على خفض مستوى برولاكتين في الدم كما تقلل مضادات استيل كولين ومسكنات الألم المورفينية من تأثير دومبيريدون على حركة القناة الهضمية ويزيد دومبيريدون من امتصاص الأدوية نتيجة تأثيره على سرعة إفراغ محتويات المعدة إلى الأمعاء .

التداخلات مع الاختبارات المعملية:

لا توجد.

الجرعات الزائدة وعلاجها:

تتناول كميات كبيرة من الدواء عن طريق الخطأ قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات بالقتضاء الهضمية وبعض الاضطرابات العصبية وفي هذه الحالة يجب إفراغ محتويات المعدة وعلاج الأعراض .

العبرة:

عالية تحتوي على ٢٤ كبسولة أو ٥ أقمار للكبار.

زجاجة تحتوي على ١٢٠ مل أو ٢٠٠ مل معلق.

الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة (١٥ - ٢٠)°C .

وتحفظ الكبسولات والأقمار بعيداً عن الرطوبة.

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال .

إن هذا الدواء

الدواء يستعمل بطرق أخرى مستحقة واستهلاقه خلاقاً

التعليقات برصد الطعن.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتوصف

عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وفي

شعرك وشخصيتك.

- لا تقطع مسودة العلاج العسيدة لك مسرع

للقضاء للشك.

- لا تتوقف عن صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيدالة العرب

صنع في مصر

PHARCO
PHARMACEUTICALS



الإسكندرية