

سيلدينافيل

التركيب:

كل قرص فيجوريكس يحتوى على:
سيلدينافيل (على هيئة سترات) ٥٠ مجم

كيفية عمل المستحضر:

يعمل مستحضر فيجوريكس بطريقة تعتمد على فيسيولوجية عملية الانتصاب الطبيعية كنتيجة لحدوث مؤثر جنسى. فمستحضر فيجوريكس يعمل على تدفق الدم بالصورة اللازمة الى العضو الذكري وذلك كاستجابة طبيعية للإثارة الجنسية ويؤدى ذلك الى حدوث انتصاب العضو الذكري، ولا يحدث هذا التأثير فى حالة استخدام المستحضر دون وجود المؤثر الجنسي. يحدث فيجوريكس هذا التأثير عن طريق وقف عمل إنزيم الفوسفودايستريز (النوع الخامس) الموجود فقط فى أنسجة العضو الذكري، ويعمل هذا الإنزيم على تكسير مادة جوانوزين أحادى الفوسفات الحلقي المسئولة عن زيادة تدفق كمية الدم اللازمة الى العضو الذكري لحدوث الانتصاب.

دواعى الاستعمال:

يستخدم مستحضر فيجوريكس لعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال والذي يعرف على انه استمرارية عدم القدرة على حدوث الانتصاب أو عدم القدرة على استمرار الانتصاب الكافى لإكمال الجماع.

نواهي الاستعمال:

- يجب عدم استخدام أى دواء يحتوى على النيترات أو أى شكل من اشكال النيترات المستخدمة لتخفيف الام الذبحة الصدرية أثناء استخدام مستحضر فيجوريكس لأن فيجوريكس قد يسبب زيادة غير مرغوبة فى تأثير هذه الأدوية.
- يجب عدم استخدام فيجوريكس عند وجود أى تفاعلات حساسية لأى من مكوناته، ويمكن أن تكون تلك الحساسية عبارة عن طفح جلدى أو حكة أو تورم بالوجه.
- ❖ إذا ظهرت أى من هذه الأعراض فإنه يتوجب استشارة الطبيب.

الاحتياطات:

- من المحتمل أن يحدث فيجوريكس انخفاضاً طفيفاً وموقتاً فى ضغط الدم.
- يجب إجراء فحص طبي دقيق لتشخيص خلل الانتصاب للتأكد من إمكانية استخدام فيجوريكس بأمان على حدة أو مع الأدوية الأخرى، ويجب على الطبيب التأكد من سلامة القلب للتأكد من قدرته على تحمل المجهود الزائد المصاحب لعملية الجماع.
- يجب استخدام فيجوريكس أقراص بحذر فى الحالات الآتية:
- أى أمراض بالقلب أو الدورة الدموية.
- مرض التهاب صبغة الشبكية و هو مرض نادر بالعين.
- أمراض الكلى أو الكبد المزمنة.
- مرضى ضغط الدم المنخفض (أقل من ٩٠/٥٠) أو مرضى ضغط الدم المرتفع (أعلى من ١٧٠/١١٠).

الأثار الجانبية:

كما هو الحال مع معظم الأدوية قد يتسبب فيجوريكس فى حدوث آثار غير مرغوبة، وهذه الآثار عادة ما تكون من خفيفة الى متوسطة الحدة بطبيعتها ولا تستمر أكثر من عدة ساعات، وبعض هذه الأعراض غالباً ما تحدث من الجرعات العالية، وأكثر الآثار الجانبية شيوعاً هى الصداع واحمرار الوجه واضطرابات بالمعدة. أما تلك الأقل شيوعاً هى الدوار، وانسداد الأنف، وتلون الرؤية المؤقت، وزيادة حساسية العين للضوء والرؤية غير الواضحة.

الجرعة:

يؤخذ قرص واحد (٥٠ مجم) قبل الجماع بساعة، حيث يبدأ تأثير الدواء خلال ٣٠ دقيقة و يستمر ٤ ساعات، ويمكن تخفيض الجرعة الى نصف قرص (٢٥مجم) أو زيادتها الى قرصين (١٠٠مجم) بناء على التأثير المطلوب الذى يختلف من فرد الى آخر ولا ينصح باستخدام فيجوريكس أكثر من مرة واحدة يومياً.

العبوة:

علبة بها شريط يحتوى على ٢ قرص.