فيسيرالجين
(شراب)
تيمونيوم ميثيل سلفات

إقرأ محتويات هذه النشرة بعناية قبل بدء تعاطى هذا الدواء.
إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
لمزيد من الإستفسارات استشر الطبيب أو الصيدلي.
هذا الدواء موصوف لك فقط فلا تشارك تعاطيه مع الآخرين فقد يضرهم حتى لو تشابهت أعراض المرض.
إذا تفاقمت أي من الآثار الجانبية أو إذا لاحظت أي آثار جانبية أخرى يرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي.
لا تكرر استعمال هذا الدواء بدون استشارة الطبيب.

تحتوى هذه النشرة على:
- ما هو فيسيرالجين شراب وما هى دواعي استعماله.
- قبل القيام باستعمال فيسيرالجين شراب.
- طريقة استعمال فيسيرالجين شراب.
- الأثار الجانبية المحتملة لفيسيرالجين شراب.
- طريقة حفظ فيسيرالجين شراب.
- معلومات أخرى.

ما هو فيسيرالجين شراب وما هى دواعي استعماله :

المجموعة الدوائية العلاجية:
مضاد للتقلصات و مضاد للمستقبلات الكولونية.

دواعى الاستعمال:
فيسيرالجين شراب هو دواء مضاد للتقلصات و يوصى باستعماله فى حالات آلام الجهاز الهضمي و الجهاز البولى التناسلى.

قبل القيام باستعمال فيسيرالجين شراب:

لا تستخدم فيسيرالجين شراب في الحالات الأتية:
الجلوكوما.
عسر التبول (الذى يصاحب اختلالات البروستاتا و المثانة البولية).
إذا كان لديك حساسية تجاه المادة الفعالة (تيمونيوم ميثيل سلفات) أو تجاه أى من مكونات الدواء الأخرى.
للرضع أقل من ٦ شهور بالعمر.
فرط الحساسية لمادة (تيمونيوم ميثيل سلفات).
لا يجب تعاطى المستحضر للمرضى الذين يعانون من اضطرابات وراثية نادرة مثل عدم القدرة على امتصاص سكر الفركتوز، سوء امتصاص الجلوكوز أو الجالاكتوز أو نقص إنزيم سكراز ايزومالتاز.
إذا كنت غير متأكد فأخبر الطبيب أو الصيدلى قبل استعمال الدواء.

التحذيرات و الإحتياطات:
- يراعى توخى الحذر عند استعمال المستحضرات التي تحتوى على مادة (تيمونيوم ميثيل سلفات) للمرضى الذين يعانون من أو/ يتوقع إصابتهم بالجلوكوما او تضخم البروستاتا.
- يستعمل المستحضر بحذر لمرضى الفتق السرى المصاحب لارتجاع المريء حيث ان الأدوية المضادة للكولين قد تؤدى الى تفاقم الحالة.
- أثبتت التقارير على الرضع ذوى أعمار ٣ شهور أو أقل عند تعاطيهم المستحضرات المثيلة حدوث أعراض تنفسية (ضيق التنفس، هبوط التنفس، توقف التنفس) بالاضافة الى حدوث تشنجات، اغماء، اختناق، تذبذب النبض.
- يجب عدم تعاطي تيمونيوم ميثيل سلفات للرضع أقل من ٦ شهور من العمر.
- إذا كان طبيبك قد أخبرك بأنك لا تستطيع أن تتحمل بعض أنواع من السكريات، إستشر طبيبك قبل استعمال فيسيرالجين شراب لأنه يحتوى على سكر السكروز.

يراعى توخى الحذر عند استعمال فيسرالجين شراب فى الحالات الآتية:
- إضطرابات حادة فى الكلى أو الكبد.
- إضطرابات فى القلب.
- إضطرابات فى الغدة الدرقية.
- الإلتهاب الرئوى المزمن.
- إضطرابات الجهاز الهضمى.
- فى حالة المرضى الملازمين للفراش أو قليلى النشاط البدنى.

تعاطى فيسيرالجين شراب مع الأدوية الأخرى:
إستشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو قد تناولت مؤخراً أيّة أدوية أخرى بما في ذلك تلك التي حصلت عليها دون وصفة طبية.

تعاطى فيسيرالجين شراب مع الطعام أو الشراب:
لا يوجد تحذيرات.

تعاطى فيسيرالجين شراب مع الأدوية العشبية:
لا يوجد تحذيرات.

تعاطى فيسيرالجين شراب أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية:
تجنبى تعاطى فيسيرالجين شراب أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية قبل استشارة الطبيب.
إستشيرى الطبيب قبل تناول أية أدوية أثناء الحمل و الرضاعة الطبيعية.

تعاطى فيسيرالجين شراب أثناء القيادة واستخدام الآلات:
احتمال حدوث اضطرابات فى الرؤية تجعل من الخطر تعاطى فيسيرالجين شراب أثناء القيادة أو تشغيل الألات.

طريقة استعمال فيسيرالجين شراب:

الجرعة للأطفال:
٣ ملاعق صغيرة لكل ٥ كجم من وزن الجسم يومياً.

الجرعة للبالغين:
١ إلى ٣ ملاعق كبيرة بمعدل ٣ مرات يومياً.
لاستكمال مفعول فيسرالجين يمكن استعمال جرعة إضافية من فيسرالجين أقماع بمعدل ١ إلى ٢ لبوسة يومياً.
إلتزم بتعاطى الدواء طبقاً لجرعة التى يصفها لك الطبيب.

ماذا لو تعاطيت كمية من فيسيرالجين شراب أكثر مما يجب:
أبلغ الطبيب المعالج فوراً.

ماذا لو نسيت استخدام جرعة معينة من فيسيرالجين شراب:
تعاطى الجرعة التى نسيتها بمجرد أن تتذكرها و إذا كان موعد الجرعة التالية قد حان فلا تستخدم جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيتها و انما تعاطى الجرعة الحالية فقط و أكمل النظام العلاجى كما وصفه لك الطبيب.

ماذا لو توقفت عن استخدام فيسيرالجين شراب:
لا تتوقف عن استخدام فيسيرالجين شراب بشكل مفاجئ.
لمزيد من المعلومات أو أية استفسارات أخرى حول استخدام فيسيرالجين شراب، إسأل الطبيب أو الصيدلي.

الآثار الجانبية المحتملة لفيسيرالجين شراب:
نادرة الحدوث وفى بعض الحالات قد يحدث جفاف بالفم، إحساس بالعطش ، دوار.
سجلت التقارير حدوث آثار نادرة وهن، سكون، زغللة الرؤية، طفح جلدى، امساك ، فقدان الشهية ،غثيان، قىء، صداع، صعوبة التبول.

تقارير الآثار الجانبية المتوقعة:
من المهم تسجيل الأثار الجانبية المتوقعة بعد ترخيص المستحضر الدوائي حيث يسمح ذلك باستمرار متابعة تقييم فوائد/مخاطر المستحضر الدوائي.

طريقة حفظ فيسيرالجين شراب:
- يحفظ المستحضر بعيداً عن متناول أيدى الأطفال.
- لا تتعاطى المستحضر بعد انتهاء فترة الصلاحية المدونة على العبوة.
- حفاظاً على البيئة، استشر الصيدلى فى التخلص من الأدوية غير المرغوب في استعمالها أو منتهية الصلاحية و لا تتخلص منها عن طريق إلقائها فى مياه الصرف الصحى أو فى المخلفات.

معلومات أخرى:

بيان التركيب:
تحتوى كل ٥ ملل من فيسرالجين شراب على:

المادة الفعالة:
تيمونيوم ميثيل سلفات .... ١٠ مجم.

المواد غير الفعالة:
سكروز - سترات صوديوم ثنائى المائية - حمض الستريك أحادى المائية - جليسرول - مكسب طعم الفراولة - لون أحمر (نيو كوكسين) - ميثيل بارا هيدروكسي بنزوات - إيثانول - ماء معالج.

العبوة:
علبة كرتون تحتوى على عبوة زجاجية سعة ١٢٠ ملل مع النشرة الداخلية.

إن هذا الدواء
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و إستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الإستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
مجلس وزراء الصحة العرب و إتحاد الصيادلة العرب

SEDICO
سيديكو
إنتاج
شركة الوجه القبلى للصناعات الدوائية
سيديكو
مدينة ٦ أكتوبر - مصر
تليفون : ٣٨٦-٦٦١/٣٨٦-٨٧٦/٣٨٦-٥١٠/٣٨٦-٥٧٨/٣٨٦-٥٧٥
فاكس : ٣٨٦-٦٦٢

AE025000006000 07/15