



فنتولين طارد للبلغم شراب

سلفات السليبيوتامول- جويافينزين

بيان التركيبة:
كل ١٠ مل من الشراب يحتوي على:
سليبيوتامول على هيئة سلفات ٢ مجم
جويافينزين ١٠٠ مجم

الخواص:
هيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلوز، بنزوات الصوديوم، سكارين الصوديوم، حمض اللاكتيك، هيدروكسيد الصوديوم، نكهة البرتقال، ماء نقي.

دواعي الاستعمال:

يعتبر السليبيوتامول من مخففات بلغم ٢- مستعملات الاذنين يستخدم لعلاج و منع حدوث التقيح الشعبي. له مفعول موسع للشعب الهوائية قصير المدى (٤ ساعات) لاستناد الشعب الهوائية الانكماشية نتيجة لتورم الربو، التهاب الشعب الزم، انتفاخ الرئة لا يجب ان يكون موسعات الشعب الهوائية هي العلاج الوحيد للمرضى بالرئة المزمنة، يستخدم لعلاج بالكرتريكوستيرويدات المستنشقة مع المرضي الذين لا يستجيبون للسليبيوتامول مع الربو حتى يتم الحصول على نتيجة والتحكم بالمرض. ان فشل العلاج بالسليبيوتامول يمكن ان يودي الى ضرورة استشارة طبية، ان التركيبة المركبة من السليبيوتامول و الجويافينزين تعمل على علاج انسداد الجهاز التنفسي و تخمين الشهوة الربوية اضطرابات الجهاز التنفسي عندما يكون التقيح الشعبي و الاذرات الكثيرة للخلط سبب تعديدا، مثال: الربو الشعبي انتفاخ الرئة الجراحة و طريقة الاستعمال:

ان السليبيوتامول له تأثير ملحي من ٦-٤ ساعات عند كل المرضي ان زيادة تأثير مخففات البلغم ٢ يمكن ان يعطى مؤشر لسوء حالة الربو. في هذه الحالة فانه يجب اعادة تقييم الحطة العلاجية للمرضي لانه من المفروض استخدام الجلوكورتيكويدات. يجب تناول الجرعة تبعاً لإرشادات الطبيب لان زيادة الجرعة من الممكن ان تؤدي الى زيادة الآثار الجانبية.

البالغين:
١-٢٠٠ مل من الشراب (٤-٢ مجم سليبيوتامول) ٣-٢ مرات يوميا.
الأطفال:
٢-٦ سنة: ١٠٠ مل من الشراب الطارد للبلغم (٢ مجم سليبيوتامول) ٣-٢ مرات يوميا.

٣-٢ سنة: ٦٤ نقطة: ٢٠٠-٤٠ مل من الشراب الطارد للبلغم (٤-٢ مجم سليبيوتامول) ٣-٢ مرات يوميا.
مجموعات خاصة من المرضي بالنسبة للمرضي كبار السن الذين لديهم حساسية من الادوية المخففة للبلغم اذنين. ينصح ببدء العلاج ب ١٠ مل من الشراب الطارد للبلغم ٣ او ٤ مرات يوميا.

موانع الاستعمال

يمنع مع المرضي الذين لديهم حساسية ضد اى من مكونات المستنقر.

التحذيرات والاحتياطات:

ان علاج الربو يجب ان يكون على مراحل و يجب مراقبة المرضي و متابعة عن طريق اختبارات وظائف الرئة في حالة زيادة استخدام مخففات بلغم ٢- المستنشقة للتحكم في الربو يجب اعادة تقييم الحطة العلاجية للمرضي. ان تتدهور الفعالية او الترددي في التحكم في الربو هو مهيئ للحياة و يجب الاخذ في الاعتبار بداية و زيادة العلاج بالكرتيكوستيرويدات. يجب تحذير المرضي بأنه اذا قلص العلاج او قلت مدة تأثير الدواء فانه ينبغي عدم زيادة الجرعة او تكرار تناولها و انه يجب استشارة الطبيب.

يجب تناول السليبيوتامول بعذر في حالات التسمم الدرزي. يجب توخي الحذر عند الالتهام المزمن لمنهبات الرئتين، السيرويدات، مدرات البول، في حالات الربو العادة و حالات نقص الكالسيوم. يجب متابعة نسبة البوتاسيوم في الدم في هذه الحالات. في الغالب مع معظم الادوية المستنشقة يتناثر دريزان، فإن السليبيوتامول و الجويافينزين، يمكنهما عمل تأثيرات ايجابية عكسية من زيادة منكر الدم. و ان مرضي السعال لا يمكنهم تعويض ذلك دونت بعض التحذيرات وجود الحساس الكروني. و ان الاستخدام المزمن مع الكورتيكوستيرويدات يزيد من تأثير ذلك. ان الاستخدام الطويل للسليبيوتامول و الجويافينزين يزيد من تسمون الاسنان و انه يجب المحافظة على نظافة الاسنان. **تفاعلات الدواء مع الادوية الاخرى:** السليبيوتامول و الادوية التي تخلق مستقلات الببتا الغير التفاعلية مثل البروبرانولول لا يجب وصفها معا. لا يمنع استخدام السليبيوتامول مع المرضي الذين يتناولون منبهات التوامين او كسبيدي.

الحمل و الرضاعة

الحمل

لا يوجد معلومات عن تأثير السليبيوتامول على الخصوبة لدى الانسان. لا يوجد اثر جانبية على الخصوبة في الحيوانات. و لا يوجد تأثير الجويافينزين على الخصوبة في الانسان.

الرضاعة

يمكن تناول الدواء أثناء الحمل عندما تكون الفائدة المتوقعة اكبر من الآثار الجانبية التي قد تحدث للجنين. لم يستدل على درجة امان الجويافينزين خلال الحمل. يجب تناول الجرعة في لبن الام و يفضل عدم تناوله خلال فترة الرضاعة الا اذا كانت الفائدة المتوقعة اكبر من المخاطر التي قد تحدث.

انه من غير المعروف اذا كان هناك تأثير خاص للسليبيوتامول على الرضع. **القدرة على القيادة و العمل امام المشاتل** لا توجد معلومات متاحة

الآثار الجانبية:

ان الدواء يهاجم على اى من السليبيوتامول و الجويافينزين و ان شدة الآثار الجانبية تعتمد على كل مكون من هذه المكونات ان التفاعلات الحساسية بماهولة ليعا نوع الحساس و التكرار و يعرف طبقا للآثار:

شائع جدا (١٠/١٠٠)، شائع (١٠٠/١٠٠٠) (١٠/١٠٠)، غير شائع (١/١٠٠٠) الى (١٠٠/١٠٠٠٠)، نادر (١/١٠٠٠٠) الى (١٠٠/١٠٠٠٠٠) و نادر جدا (١/١٠٠٠٠٠) بما في ذلك التقارير المنفصلة السليبيوتامول:

اضطرابات الجهاز الهضمي:
نادر جدا: تفاعلات الحساسية و تقيح و عافية و ارتكازية، تقلص شعري، انخفاض ضغط الدم، تقيح.

اضطرابات الاذن و العذبة:
نادر: نقص السليبيوتامول في الدم

اضطرابات الجهاز العصبي:
شائع جدا: رعشة
شائع: صداع
نادر جدا: زيادة النشاط

اضطرابات القلب:
شائع: زيادة دقات القلب، عدم انتظام النبض.
نادر: عدم انتظام دقات القلب بما في ذلك الرجفان البطيني، عدم انتظام دقات القلب فوق البطيني.

اضطرابات و عافية:
نادر: تورم ارجل الحساسية
اضطرابات الاسهال العفوية و الضلعة

شائع: نقص شعري
نادر جدا: شعور الصلابة بالاجهذ

الجويافينزين

غير معروف: فرط الحساسية و تفاعلات الحساسية و الصدمة، و عافية و طفح، ارتكازية، بحة في الصوت.

اضطرابات الجهاز الهضمي:
غير معروف: غثان، قيء، عدم ارتياح في البطن.
تجولر الجرعة:

لمعرفة اعراض و علامات زيادة الجرعة للسليبيوتامول انظر فترة التحذيرات و الاحتياطات و الآثار الجانبية ان الجرعات الكبيرة من الجويافينزين تسبب الغثان و القيء.

العلاج:
رجاء الاتصال بالطبيب او الجوز مركز مسوم.

التخزين:
يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ ٠م.
العوة:
علبة بها زجاجة ١٢٥ مل + شرة داخلية

صنعي: جلاكسو سميكلابن - مدينة السلام - القاهرة - مصر

