



فيوسى-زون كريم

(حمض فيوسيديك 1% و هيدروكورتيزون أسيتات 1%)
مضاد حيوي / كورتيكوستيرويد موضعي

التصنيف العلاجي:

مضاد حيوي / كورتيكوستيرويد موضعي
خواص الدواء الفارماكولوجية:

يجمع فيوسى-زون مابين التأثير المضاد للبكتيريا لحمض فيوسيديك ونشاط الهيدروكورتيزون أسيتات المضاد للالتهاب. التأثير المضاد للبكتيريا لحمض فيوسيديك ينتج من تثبيطه لتخليق البروتين. ويؤثر حمض فيوسيديك على البكتريا موجبة الجرام خاصة المكورة العقنودية البرتقالية. هيدروكورتيزون أسيتات مضاد للالتهاب والحكة بالإضافة الى تأثيره القابض للأوعية الدموية. تعتبر آتية التأثير المضاد للالتهاب غير واضحة ولكن يعتقد أن الكورتيكوستيرويدات تحفز البروتينات المتبطة لإنزيم فوسفوليبيز (A2) وبذلك تمنع تكوين حمض الأراكيدونيك والتخليق الحيوي لوسائط الالتهاب.

يخترق كل من حمض فيوسيديك والجلوكوكورتيكويدات الجلد بنفس القدر. حيث يعبر ٢٧% من حمض فيوسيديك الموضعي الجلد السليم، في حين يتم امتصاص ٥٠-٨٠% من هيدروكورتيزون. وقد يكون امتصاص هيدروكورتيزون أعلى في بعض أجزاء الجسم دون الأخرى مثل الوجه، الفخذ، الإبط أو في المناطق المجروحة أو المتهبة من الجلد كما في حالة الالتهاب الجلدي التحسسي.

وقد ثبت أن فيوسى-زون له فاعلية أفضل في علاج التهاب الجلد التحسسي الشديد أو متوسط الشدة الناتج من العدوى بالموكورة العقنودية البرتقالية من كل من مكوناته بمفرده. حيث أدى استخدام فيوسى-زون إلى تقليل الأعراض الصاحبة للالتهاب (الطفح الوردي، التقشير، الإديما، الحكة والإفرازات) بالإضافة إلى إزالة العدوى البكتيرية تماماً خلال ١٤ يوم في العلاج. ولكن لا توجد معلومات تخص إنتكاسة المرض.

موانع الاستعمال:

يستخدم فيوسى-زون لعلاج التهاب الجلد التحسسي الشديد أو متوسط الشدة الناتج جزئياً من العدوى بالموكورة العقنودية البرتقالية، حيث أن وجودها يكون مصحوباً بتكون القشور أو طفح وردي. فيوسى-زون له فاعلية مضادة للبكتيريا تعمل على التخلص من الموكورة العقنودية البرتقالية في الجروح الجلدية بالإضافة الى تأثيره المضاد للالتهاب.

موانع الاستعمال:

- لا يستخدم فيوسى-زون في حالة الحساسية المفرطة لحمض فيوسيديك، هيدروكورتيزون أسيتات أو أي من المكونات الأخرى للكريم.
- كما في المستحضرات الموضعية الأخرى التي تحتوي على مضاد حيوي / كورتيكوستيرويد، لا يستخدم فيوسى-زون في حالات العدوى بفصائل بكتريا غير حساسة، العدوى بالفطرية، درن الجلد، عدوى الجلد بالزهري، جذري الدجاج، الجروح السطحية الناتجة عن التعليمات والأمراض الفيروسية الجلدية.

التحذيرات:

عند استخدام الكريم تحت ضمادة أو على مساحات كبيرة أو على الوجه، فروة الرأس، الإبط أو الصفن، قد يحدث امتصاص للكريم بكمية قد تؤدي إلى تثبيط الغدة الكظرية بالإضافة الى تأثيرات جهازية أخرى.

الاحتياطات:

- لا يستخدم فيوسى-زون داخل العين أو بالقرب منها لتفادي حدوث التهاب في القرنية من حمض فيوسيديك، كما أن استخدام الكورتيكوستيرويدات الموضعية بالقرب من العين قد يؤدي إلى زيادة ضغط العين، جلوكوما أو مياه بياض.
- المستحضرات التي تحتوي على ستيرويد، لا يجب أن تستخدم لأكثر من ١٤ يوم في حالة عدم وجود تحسن، حيث أن الستيرويد قد يحجب تفاعلات الحساسية المفرطة.
- كما في حالة المضادات الحيوية الموضعية الأخرى، قد يؤدي الاستخدام لمدة طويلة أو تكرار الإستعمال إلى الإصابة بفصائل غير حساسة للمستحضر. وفي حالات أخرى قد يزيد من احتمال حدوث تهيج ومقاومة للمضاد الحيوي.
- نادراً ما تحدث حساسية وتهيج نتيجة استخدام الموضعي للكورتيكوستيرويدات وضع المستحضر على مساحات كبيرة أو استخدامه بكميات كبيرة أو تحت ضمادة يؤدي إلى امتصاص الكريم جهازياً وتطور أعراض تثبيط الغدة الكظرية. قد يحدث ضمور وقد تظهر خطوط بيضاء خاصة في مناطق انشاء التذرعين أو الساقين من الداخل والوجه.

الحمل والرضاعة:

لم يثبت بعد أمان استخدام حمض فيوسيديك أو هيدروكورتيزون موضعياً أثناء الحمل أو الرضاعة. لذلك لا يستخدم فيوسى-زون أثناء الحمل أو الرضاعة إلا تحت الضرورة القصوى.

لم تثبت الدراسات في الحيوانات وجود أي تشوهات للأجنة نتيجة استخدام حمض فيوسيديك. وجد أن حمض فيوسيديك يعتبر المشيمة بعد التناول الجهازى كما في لبن الثدي. الاستخدام الموضعي للكورتيكوستيرويدات في الحيوانات أثناء فترة الحمل قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في نمو الجنين، مثل فطوح القمم وتأخرية النمو الداخلي للرحم، وقد يحدث ذلك في جنين الإنسان بالمثل.

الأطفال:

لم تظهر الدراسات الإكلينيكية أي زيادة في الأعراض الجانبية بالنسبة للأطفال من سن ٣ سنوات فأكثر. ومع ذلك يعتبر الأطفال أكثر عرضة من البالغين لحدوث تثبيط الغدة الكظرية نتيجة استخدام الكورتيكوستيرويدات الموضعية ويرجع ذلك لزيادة كمية الكورتيكوستيرويد الممتصة. ولذلك يجب تجنب استخدام فيوسى-زون لمدة طويلة وبصورة مكثفة خاصة مع استعمال ضمادة.

الأعراض الجانبية:

أظهرت الدراسات الإكلينيكية أن المريض يتحمل فيوسى-زون بشكل جيد وقد يصاحب استخدامه بعض الأعراض الجانبية، حيث أظهر ٣٢% من المرض أعراض غير مرغوبة. هذه الأعراض لم تكن خطيرة وإنحصرت في تهيج موضعي (٤١.٦%) و زيادة في وزغ التهاب الجلد (١١.٦%). لم يتطلب التهيج الموضعي إيقاف العلاج. وثبت حالات نادرة من الحساسية المفرطة. الأعراض الجانبية موضعية وتشمل: جفاف الجلد، حكة، قرقان، تهيج موضعي، خطوط بيضاء، ضمور الأنسجة تحت الجلد، توسع الأوعية الدموية، فرط نمو الشعر، تغير في صفة الجلد و عدوى ثانوية. في حالة وضع الكريم على الوجه قد يحدث حب وردي أو التهاب حول الفم.

أعراض و علاج الجرعة الزائدة:

لم يثبت حدوث إفراط للجرعة مع الاستخدام الموضعي لكريم فيوسى-زون. ولكن قد تحدث أعراض جانبية مصاحبة للإستعمال الموضعي لهيدروكورتيزون.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

يدهن فيوسى-زون ٣ مرات يومياً على المناطق المصابة لمدة أسبوعين وهفاً للدراسات الإكلينيكية ويمكن تقليل فترة العلاج إذا تحسنت الحالة.

لا توجد أي معلومات من دراسات إكلينيكية عن أمان وصحة استخدام فيوسى-زون في الأطفال أقل من ٣ سنوات.

العبوة:

أنبوبة ألومنيوم تحتوي على ١٥ جرام.

الحفظ:

يحفظ عند درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠°م، يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

التركيب:

يحتوي كل ١٠٠ جرام كريم على:

المواد الفعالة:

حمض فيوسيديك ٢ جم
خلات الهيدروكورتيزون ١ جم

المواد الغير فعالة:

سيتيل الكحول، جليسريل مونوستيارات، بارافين سائل، بارافين أبيض لين، بروبيلين جليكول، ميثيل بارابين، بروبيول بارابين، بولي سوربات ٨٠، سوربيتان مونوستيارات، حمض سيتريك اللا مالني، داي بيزيك صوديوم فوسفات، ماء نقي.

إنتاج

الشركة الصرعونية للأدوية (فارو فارما) PHARMA

مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - بلك ١٦ - قطعة رقم (١) - الاسكندرية - ج.م.ع

