

موسيدين® أقراص وشراب

لوراتادين

مضاد للحساسية ممتد المفعول لا يسبب النعاس

التركيب

- أقراص : يحتوى كل قرص على :
لوراتادين ١٠ مجم
المواد الغير فعالة
كالسيوم فوسفات داي هيدريت لاکتوز مونوهيدريت، ميكروكريستالين سيليلوز،
بوفيدون، كروسبوفيدون، ستيرات الماغنيسيوم، تلك، ابروسيل
شراب : تحتوى كل ملعقة ٥ مليلتر على :
لوراتادين ٥ مجم .
المواد الغير فعالة
بروبيلين جيلكول، توين ٨٠، سكروز، حامض الستريك، حامض البنزويك،
ساكارين صوديوم، فينلئول بلس، طعم الفراولة، ماء، كحول

الخواص :

يعتبر لوراتادين (موسيدين*) مضاد للحساسية .
مضادات الحساسية تستخدم كملاخ لتقليل أعراض الحساسية عن طريق منع
تأثير بعض المواد مثل الهستامين التى تنتج عن طريق الجسم .

دواعى الإستعمال :

يستخدم موسيدين* أقراص وشراب في
تقليل الاعراض المصاحبة لحساسية الأنف (حس القش) مثل العطس والرشح أو
حكة الأنف كذلك حرقان أو حكة العين .
لعلاج الأرتيكاريا (هرش ، أحمرار جلدى) ، الطفح جلدى أو اللسع الجلدى .

موانع الإستعمال :

- إذا كانت لديك حساسية لمادة اللوراتادين أو أى من المكونات الأخرى الغير فعالة .
- أثناء الحمل أو الرضاعة .

الإحتياطات:

- قبل تناول موسيدين* أقراص أو شراب يجب أن تخبر طبيبك أو الصيدلى إذا:
• كانت لديك مرض بالكبد .
- إذا كنت تأخذ أى أدوية أخرى بما فى ذلك الأدوية التى توصف بدون وصفة طبية
ويجب استشارة الطبيب أو الصيدلى قبل الإستعمال .
- إذا كان من المقرر ان تجرى أى إختبارات الجلد للحساسية ، لذلك يجب أن لا
تأخذ موسيدين* لمدة يومين قبل الإختبار .
- يمكن تناول موسيدين* (أقراص أو شراب) مع الغذاء والشراب أو بدون الطعام .
- لم يحدث نعاس أو دوخة مع إستعمال موسيدين* بالجرعات المقررة أثناء قيادة
الآلات أو السيارات .

الجرعة:

لايستخدم للأطفال مطلقاً أقل من سنتين
الأطفال أقل من ٦ سنوات لايستخدم إلا بمعرفة الطبيب

- البالغين والأطفال اكثر من ١٢ سنة، أو وزن الجسم اكثر من ٣٠ كجم:
قرص واحد أو ٢ ملعقة ٥ مللى مرة واحدة فى اليوم .
- الأطفال من ٢-١٢ سنة، أو وزن الجسم أقل من ٣٠ كجم:
معلقة ٥ مللى مرة واحدة فى اليوم .
- إذا كانت لديك مشاكل خطيرة بالكبد سوف يخبرك طبيبك بتناول جرعة
موسيدين* مرة واحدة كل يومين .
- لا تحدث مشاكل خطيرة عند تناول جرعة عارضة زائدة ويجب الإتصال
بطبيبك أو الصيدلى عند حدوث هذا .
- إذا نسيت تناول جرعة فى ميعادها يمكن تناولها فى أقرب وقت أو حسب الميعاد
المقرر للجرعة .

الأثار الجانبية:

- مثل بقية الأدوية قد تحدث بعض الأعراض الجانبية مع موسيدين*
(أقراص- شراب) ولكن لا تحدث هذه الاعراض الجانبية مع جميع المرضى .
- نادرا ما قد تحدث حساسية مثل صعوبة فى التنفس ، تورم الوجه، العنق،
اللسان، الحلق بعد إستعمال هذا المستحضر وعند حدوث أى من هذه الأعراض
الجانبية يجب التوقف عن تناول موسيدين* والإتصال بطبيبك .
- الأثار الجانبية الأكثر شيوعاً فى الأطفال من ٢ الى ١٢ سنة تشمل الصداع ،
العصبية والتعب .
- الأثار الأكثر شيوعاً فى البالغين والمراهقين تشمل النعاس ، الصداع ، زيادة
الشهية وصعوبة النوم .
- نادرا ما قد تحدث بعض الأعراض الجانبية مثل الدوخة ، عدم إنتظام أو سرعة
ضربات القلب والغثيان (الشعور المرضى) جفاف الفم وإضرابات المعدة ، مشاكل
فى الكبد ، سقوط الشعر ، طفح جلدى أو تعب .
- إذا حدثت أى من هذه الأعراض الجانبية يجب أن تخبر طبيبك .

العيوة :

- أقراص : شريط يحتوى على ١٠ اقراص فى عبوة من ٢،٢،١ شريط .
- شراب : زجاجة ٦٠ مليلتر مع ملعقة مدرجة .
- ظروف التخزين:
يحفظ فى درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ ° مئوية

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال



٠٢٢١١٠



V06-25/3/13

إنتاج :

شركة أمون للأدوية

مدينة العجوة ، القاهرة ، مصر .

