

ميوكو®

(أمبروكسول هيدروكلوريد)
شراب

ميوكو®

(أمبروكسول هيدروكلوريد)
شراب

موانع الإستعمال:

- في المرضى ذوى الحساسية لمادة أمبروكسول .
- مع أن الدراسات التى أجريت على حيوانات المعامل أثبتت عدم إلحاق أى ضرر بالأجنة حتى مع جرعات كبيرة إلا أننا نصح بعدم إعطاء الدواء فى فترة الثلاث أسابيع الأولى للحمل إلا بناء على أوامر الطبيب.

الجرعة والتعاطى:

الرضع:

أقل من عامين: ¼ ملعقة صغيرة (٢,٥ مليلتر)
مرتين يومياً.

الأطفال:

من ٢ - ٥ سنوات: ¼ ملعقة صغيرة (٢,٥ مليلتر)
ثلاث مرات يومياً.

أكثر من خمس سنوات: ملعقة صغيرة (٥ مليلتر) مرتين
إلى ثلاث مرات يومياً.

ويمكن عند بداية العلاج أن تتضاعف هذه الجرعات.

البالغون والكبار:

٢ ملعقة صغيرة (١٠ مليلتر) ثلاث مرات يومياً فى أول
٢ - ٣ يوم من بداية العلاج.

ثم تقل إلى ملعقة صغيرة (٥ مليلتر) ثلاث مرات يومياً
حتى يتم الشفاء التام.

ينصح باستشارة الطبيب إذا طالت مدة العلاج لأكثر من
٢ - ٣ أسابيع.

العبوة:

زجاجات بها ١٠٠ مليلتر أو ١٢٠ مليلتر .
يحفظ فى مكان بارد .

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

التركيب:

تحتوى كل ٥ مليلتر على:

أمبروكسول هيدروكلوريد ١٥ مجم

الخواص:

يتميز ميوكو شراب بفاعليته السريعة فى تهدئة
الإضطرابات الشعبية حيث يذيب المخاط فيقلل من لزوجه
ويساعد على طرده مما يحسن من حالة التنفس ويعيده إلى
الحالة الطبيعية.

كذلك يساعد ميوكو شراب على حماية الغشاء المخاطى
المبطن للجهاز التنفسى. ومن المؤكد أن ميوكو شراب
دواء يتحملة المريض بطريقة ممتازة.

ميوكو شراب لا يحتوى على كحول ، ويناسب مرضى
السكر .

حركية الدواء:

- تصل نصف حياة أمبروكسول بالبلازما إلى ٤ ساعات .
- تصل قمة تركيزه بالبلازما بعد ساعتين من التعاطى .
- ويطرح كلية عن طريق الكلية .

دواعى الإستعمال:

- الحالات الحادة والمزمنة لأمراض الجهاز التنفسى التى
تكون مصحوبة بوجود مخاط لزج مثل: الإلتهاب الشعبى
المزمن ، الإلتهابات الشعبية مثل الرئوية ، الربو الشعبى ،
وتوسع الشعب المرضى .

- كذلك ثبت أن ميوكو شراب يذيب ويطرد المخاط عند
حدوث الإلتهاب البلعومى الأنفى .

الأعراض الجانبية:

فى بعض الحالات النادرة قد يحدث ألم فى المعدة وإسهال
وطفح جلدى .



جلوبال نابى للأدوية

المنطقة الصناعية الثانية - مدينة ١٦ أكتوبر - مصر
www.globalnapi.com

STADA

بترخيص من شركة ستادا - بألمانيا
صانع شركة جيرما فارم المحدودة