

نابى فت

بيان التركيب:

يحتوي كل قرص مغلف من نابى فت ٥٠ مجم على سيلدنافيل سينترات مكافئ للسيلدنافيل ٥٠ مجم.
يحتوي كل قرص مغلف من نابى فت ٧٥ مجم على سيلدنافيل سينترات مكافئ للسيلدنافيل ٧٥ مجم.
يحتوي كل قرص مغلف من نابى فت ١٠٠ مجم على سيلدنافيل سينترات مكافئ للسيلدنافيل ١٠٠ مجم.

المواد الغير فعالة:

هايدروكسي بروبيل سيللوز (Klucel) LF ، كروسكارميللوز صوديوم ، سيللوز بلورى مجهري،
ماغنيسيوم ستيرات، كوللويدال سيليكون داي اكسيد، نشا جلايكولات الصوديوم، ماء نقي.
نابى فت ٥٠ مجم ، نابى فت ٧٥ مجم: لون أزرق- لون فضي
نابى فت ١٠٠ مجم: لون أحمر، لون فضي

التأثير الدوائي:

نابى فت (سيلدنافيل) هو مثبط لإنزيم فوسفودايستريز ٥ (PDE5)، وتأثيره أكثر قوة على (PDE5) عن تأثيره على إنزيمات فوسفودايستريز المعروفة الأخرى.
سيلدنافيل يحفز تأثير أكسيد النيتريك (NO) الذي يفرز خلال عملية الاستثارة الجنسية، وذلك عن طريق تثبيط عمل (PDE5) المسئول عن تحويل الجوانوسين أحادي الفوسفات (الحقن) (cGMP) من الجسم الكهفي حيث أن زيادة نسبة (cGMP) تسبب إرخاء العضلات النساء (الإرادية) وتدفق الدم من الجسم الكهفي.

الحركة الدوائية:

سيلدنافيل يمتص سريعاً عند تعاطيه بالفم، وتصل الإثاحة الحيوية له إلى ٤٠% ويكون أعلى تركيز له ببلازما الدم خلال ١٢٠-٣٠ دقيقة، ويقل معدل الإمتصاص في حالة وجود الطعام بالمعدة.
يتم توزيع سيلدنافيل على نحو واسع في الأنسجة ويرتبط حوالي ٩٦% ببلازما الدم. يتأبض سيلدنافيل بشكل رئيسي في الكبد عن طريق سيتوكروم P450 أيزوإنزيم CYP3A4 (المسار الرئيسي) و CYP2C9 ونتاج الأيض الرئيسي هو إن-ديسميثايل سيلدنافيل وله بعض النشاط مدة نصف العمر النهائي للسيلدنافيل ونتاج الأيض الحيوي له حوالي ٤ ساعات. يتخلص الجسم منه في صورة النواتج الأيضي عن طريق البراز بصورة رئيسية ودرجة أقل عن طريق البول. قد تقل القدرة على التخلص منه عند كبار السن ومرضى الفشل الكبدى والفشل الكلوي الحاد.

دواعي الإستعمال:

يستخدم نابى فت في علاج الخلل الوظيفي لعلاج الإنتصاب.

الجرعة وطريقة الإستخدام:

الجرعة الموصى بها لمعظم المرضى هي ٥٠ مجم تؤخذ حسب الحاجة قبل ممارسة النشاط الجنسي بساعة تقريباً. على أية حال فإنه من الممكن أخذ نابى فت في أي وقت قبل ممارسة النشاط الجنسي بنصف ساعة إلى ٤ ساعات. استناداً على تأثيره وتحمل الجسم له فإنه يمكن زيادة الجرعة بعد أقصى إلى ١٠٠ مجم أو تخفيضها إلى ٢٥ مجم. تؤخذ الجرعة مرة واحدة يومياً فقط.

موانع الإستعمال:

فرط الحساسية لأي مكون من مكونات نابى فت، المرضى الذين يعالجون بالنيترات، إعتلال العصب البصري، انخفاض ضغط الدم، سكتة دماغية حديثة، نوبة قلبية غير مستقرة و إحتشاء عضلة القلب

الأثار الجانبية:

صداع، فوران، سوء هضم، رشح، عدوى المجاري البولية، إسهال، دوخة، طفح جلدي.
مشاكل في الرؤية: وهي خفيفة وعابرة تظهر في سحابة لونية ورؤية مشوشة وزيادة الحساسية للضوء.
آثار جانبية قليلة الحدوث (<٢%): عدوى الجهاز التنفسي، آلام الظهر، أعراض انفونزا، ألم المفاصل.
آثار جانبية نادرة الحدوث (>٢%): تفاعلات حساسية الضوء، قين، تعرق، إتهاب اللسان، فقر الدم، وهن عضلي، آلام العظم، حكة (ارتيكاريا)، أحلام غير عادية.

التفاعلات الدوائية:

النيترات العضوية: سيلدنافيل ومثبطات PDE5 الأخرى قد تتسبب التأثير المخفض لضغط الدم للنيترات العضوية، وبالتالي يحظر إستعماله مع المرضى الذين يعالجون بها.

مثبطات مستقبلات ألفا: تظهر أعراض انخفاض ضغط الدم عند إستخدام سيلدنافيل مع مثبطات مستقبلات ألفا. العقاقير المثبطة للميتوكروم P450 أيزوإنزيم CYP3A4 مثل سيميبتدين، إريثرومايسين، إتراكونازول، كيتوكونازول، ومثبطات بروتياز لعلاج HIV قد تقلل من التخلص من الإنزيم فوسفودايستريز ٥ (PDE5) مما قد يتطلب تقليل جرعة نابى فت.

يجب تجنب عصير الجريب فروت لأنه قد يزيد من تركيز سيلدنافيل او مثبطات إنزيم فوسفودايستريز ٥ الأخرى في الدم.

منسبطات CYP3A4 مثل ريفاميسين قد تقلل من تركيز مثبطات إنزيم فوسفودايستريز ٥ في الدم.

الحمل والرضاعة:

ليس من دواعي الإستعمال

التحذيرات والإحتياطات:

يجب توخي الحذر في حالات مرضى الفشل الكلوي أو الفشل الكبدى الحاد وقد يضطر الى تقليل جرعات سيلدنافيل. يجب الحرص أيضاً في حالة مرضى الجهاز الدوري والتشوه التشريحي للقضيب حتى لا يسبب إستخدام المسيلدنافيل الإصابة بمرض الإنتصاب الدائم. المرضى الذين يعانون من الدوار وعدم وضوح الرؤية أو الإضطرابات البصرية لا يجب عليهم ممارسة أعمال خطيرة على الماكينات أو القيادة. يحذر إستخدام المسيلدنافيل في حالات إضطرابات القلب والنخبة الصدرية أو النوبات القلبية وعدم إنتظام ضربات القلب.

العبوات:

حافطة بها ٢ قرص سيلدنافيل ٥٠ مجم.

حافطة بها ٢ قرص سيلدنافيل ٧٥ مجم.

عبوة بها ٤ أقراص سيلدنافيل ١٠٠ مجم.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠م، في مكان جاف.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال



إنتاج:
جلوبال نابى للأدوية
مدينة ٦ أكتوبر - مصر