الدليل العلاجى للأوفراماكس

أسم الدواء: أوفراماكس

المادة الفعالة: سيفترياكسون

- ما هى حقن أوفراماكس ؟
- ما هي الآثار الجانبية المحتملة من حقن الأوفراماكس؟
- ما هي المعلومات الأكثر أهمية التي ينبغي أن أعرفها عن حقن الأوفراماكس ؟
- ما يجب ان أناقشة مع الطبيب قبل استخدام حقن أوفراماكس ؟
- كيف استخدم حقن أوفراماكس ؟
- ماذا يحدث إذا نسيت أخذ جرعة من أوفراماكس ؟
- ماذا يحدث إذا أخذت جرعة زائدة من أوفراماكس ؟
- ما الذى يجب تجنبه أثناء استخدام حقن أوفراماكس ؟
- ما هي الأدوية الأخرى التى تؤثر على حقن أوفراماكس ؟
- أين يمكن الحصول على مزيد من المعلومات؟
- ما هى حقن أوفراماكس ؟

سيفترياكسون ضمن مجموعة من أدوية المضادات الحيوية تسمى سيفالوسبورين. وهو يعمل على محاربة البكتيريا في الجسم. تستخدم حقن السيفترياكسون لعلاج العديد من أنواع العدوى البكتيرية، بما في ذلك أشكال العدوى الشديدة أو التى تهدد الحياة مثل التهاب السحايا.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة من حقن أوفراماكس ؟

إذا ظهرت أي من ظواهر الحساسية التالية أطلب المساعدة الطبية الطارئة: الشرى (أرتيكاريا)؛ صعوبة في التنفس؛ تورم الوجه، الشفاه، اللسان أو الحلق.

استدعى الطبيب إذا ظهرت أي من هذه الآثار الجانبية الخطيرة:

- اسهال مائي أو دموي؛ • حمى أو قشعريرة، • طفح جلدي و كدمات، خدر شديد، وخز، ألم، وضعف بالعضلات؛ • تحوصل أو تقشير أو طفح جلدي أحمر؛
- بقع بيضاء أو قروح داخل الفم أو على الشفاه؛ • جلد شاحب أو مصفر، بول داكن اللون، الخلط الذهنى و الضعف
- التبول أقل من المعتاد، أو لا تبول على الإطلاق؛ • تورم، ألم أو تهيج مكان أعطاء الحقنة؛

براز طباشيري اللون، ألم في المعدة بعد تناول الطعام مباشرة، غثيان وحرقه فى فم المعدة، انتفاخ، وألم شديد في المنطقة العليا للمعدة والذي قد ينتشر إلى منطقة الظهر

وقد تشمل آثار جانبية أقل خطورة:

- الغثيان، القيء، ألم في المعدة؛ • الصداع، الدوخة؛ • ألم أو تورم في اللسان؛ • التعرق أو؛ • حكة و افرازات مهبلية.

هذه ليست قائمة كاملة من الآثار الجانبية وقد يحدث غيرها. استدعى الطبيب للحصول على المشورة الطبية حول الآثار الجانبية.

ما هي المعلومات الأكثر أهمية التي ينبغي أن أعرفها عن حقن أوفراماكس؟

لا تستخدم هذا الدواء إذا كنت لديك حساسية للسيفترياكسون، أو المضادات الحيوية مثل السيفوروكسيم، سيفبروزيل، سيفاليكسين، سيفدينير و آخرون.

قبل استخدام هذا الدواء، اخبر الطبيب اذا كنت تعانى من حساسية لأي من الأدوية (ولا سيما البنسللين). و أخيرة إذا كان لديك مرض بالكبد أو الكلي، ومشاكل بالمرارة، اضطرابات بالمعدة أو الأمعاء، أو إذا كنت تعانى من سوء التغذية.

استخدم هذا الدواء طوال المدة التى حددها الطبيب. قد تتحسن الأعراض قبل علاج العدوى تماما. يستمر استخدام أوفراماكس عادة لمدة يومين على الأقل بعد اختفاء الأعراض.

لا يعالج أوفراماكس العدوى الفيروسية مثل البرد أو الإنفلونزا.

يمكن أن تسبب المضادات الحيوية الإسهال، الذي قد يكون مؤشرا لعدوى جديدة. إذا حدث اسهال مائي أو دموى، أخبر الطبيب بذلك. لا تستخدم أي دواء لوقف الإسهال ما لم يصفه لك الطبيب.

ما يجب أن أناقشة مع الطبيب قبل استخدام حقن أوفراماكس؟

لا تستخدم هذا الدواء إذا كنت لديك حساسية للسيفترياكسون، أولغيرها من المضادات الحيوية السيفالوسبورينات مثل:

- السيفاكلور • السيفادروكسيل • السيفازولين • السيفدينير • السيفديتورين • السيفبودوكسيم
- السيفبروزيل • السيفبوتين • السيفوروكسيم • السيفالكسين • السيفرادين

إذا كان لديك بعض المشاكل الصحية قد تحتاج إلى ضبط الجرعة أوعمل اختبارات معملية خاصة و ذلك للإستخدام الامن للدواء.

قبل استخدام سيفترياكسون، أخبر الطبيب إذا كنت تعانى من الحساسية لأي من الأدوية (خاصة البنيسيللينات) أو إذا كان لديك: مرض بالكلي (أو إذا كنت تعمل غسيل كلوي)؛

- أمراض بالكبد؛ • مشاكل بالمرارة؛ • اضطرابات بالمعدة أو الأمعاء مثل التهاب القولون. • إذا كنت تعانى من سوء التغذية.

الحمل الفئة باء. هيئة الرقابة على الغذاء و الدواء، من المتوقع الا يضر هذا الدواء بالجنين. أخبرى الطبيب إذا كنت حاملا أو تخططين للحمل أثناء فترة العلاج.

من الممكن أن ينتقل سيفترياكسون إلى لبن الرضاعة الطبيعية، وقد يضر بالطفل الرضيع. لا تستخدمى هذا الدواء دون استشارة الطبيب إذا كنتى ترضعي طفلك طبيعيا.

لا يستخدم سيفترياكسون في الأطفال دون مشورة الطبيب، و لا تعطى ابدا أكثر من الجرعة المقررة للطفل. و لا يستخدم للأطفال المبتسرين.

كيف استخدم حقن أوفراماكس؟

تأخذ حقنة أوفراماكس في العضل أو الوريد. يفضل أن يعطيك الحقنة الطبيب أو الممرض. ويجب معرفة الأرشادات حول كيفية أخذ الحقنة في المنزل. لا تأخذ هذا الدواء في المنزل إذا كنت لا تعرف تماما كيفية اعطاء الحقن والتصرف بشكل صحيح للابر والحقن والعناصر الأخرى المستخدمة في إعطاء الحقنة.

استخدم الدواء تماما كما وصف لك. لا تستخدمة بكميات اكبر أو لفترة أطول من الذي حددها الطبيب. اتبع الإرشادات التي حددت لك في الروشتة الطبية.

سوف تحتاج الى مزج سائل (مذيب) الى الأوفراماكس قبل الأستخدام. إذا كنت تاخذ الحقنة في المنزل، تأكد من معرفة كيفية مزج وتخزين الدواء بشكل صحيح.

استخدم فقط المذيب الذى أوصى بة الطبيب.

لا تخلط الأوفراماكس مع أي مادة مذيبة تحتوي على الكالسيوم، بما في ذلك المحاليل المغذية الوريدية.

استخدم هذا الدواء فقط للمدة المحددة من الطبيب. وقد تتحسن الأعراض لديك قبل انتهاء علاج العدوى بالكامل. يستمر عادة أخذ الأوفراماكس لمدة يومين على الأقل بعد اختفاء الأعراض.

لا يعالج أوفراماكس العدوى الفيروسية مثل البرد أو الإنفلونزا.

يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة الغرفة، بعيدا عن الرطوبة والحرارة والضوء.

لا يجمد الدواء بعد تجهيزة.

ماذا يحدث إذا نسيت أخذ جرعة من أوفراماكس؟

استخدم الدواء بمجرد تذكر الجرعة المنسية. إذا كان الوقت قريبا للجرعة التالية، تخطي جرعة المنسية واستخدم الدواء حسب المواعيد المحددة. لا تستخدم أية أدوية إضافية لضبط الجرعة المنسية.

ماذا يحدث إذا أخذت جرعة زائدة من أوفراماكس؟

اطلب الرعاية الطبية الطارئة إذا كنت تعتقد أنك أخذت جرعة زائدة من هذا الدواء.

ما الذى يجب تجنبه أثناء استخدام حقن أوفراماكس؟

يمكن للمضادات الحيوية أن تسبب الإسهال، و قد يكون ذلك مؤشرا لعدوى جديدة. إذا حدث لك اسهال مائي أو دموى، أخبر الطبيب. لا تستخدم أي دواء لوقف الإسهال ما لم يصفة لك الطبيب.

ما هي الأدوية الأخرى التى تؤثر على حقن أوفراماكس؟

قد يكون هناك أدوية أخرى يمكن أن تتفاعل مع أوفراماكس. أخبر الطبيب عن جميع الأدوية التى تستخدمها والتى بدون روشتات طبية. ويشمل ذلك الفيتامينات والمعادن ومنتجات الأعشاب الأدوية الموصوفة من أطباء آخرين. لا تبدأ باستخدام أدوية جديدة دون أن تخبر بها الطبيب.

اين يمكن الحصول على مزيد من المعلومات؟

الطبيب أو الصيدلي يمكن أن يوفر لك المزيد من المعلومات حول هذا الدواء.

اوفراماكس حقن عضلى وو ريدى

١ جرام و ٢٥٠ مجم

مع مذيب ماء معقم أو ليدوكين (بدون أبينفرين)

تصنيع كيميفارم للصناعات الدوائية لصالح شركة رانبكسى مصر