

بروكسيمول مركب حبيبات قواره

طارد لحصوات الحالب - مذيب لحمض اليوريك (البوليك) - مطهر للمسالك البوليه

التركيب :

يحتوى كل ١٠٠ جرام على :

١٨,٦ مجم

خلاصة الحلفا بر ٨ مجم بروكسيمادول

٦ جم

هيكسامين

١ جم

سترات البيرازين

الخواص :

يحمل بروكسيمول مركب بكفاءة كطارد لحصوات الحالب وذلك بواسطة المفعول الفريد لمحتواه من مادة البروكسيمادول (الموجودة في خلاصة الحلفا بر النقية) والتي تعمل على اتساع الحالب بينما تزيد الحركة الدافعة لعضلاته الملساء مساعدة في ذلك على طرد الحصوات الموجودة به.

وبروكسيمول مركب يذيب أيضاً بللورات حمض اليوريك وأملاح اليورات ويمنع ترسيبها في الجهاز البولى ويرجع هذا إلى احتوائه على مادة سترات البيرازين.

وبالإضافة إلى خواصه السابق ذكرها فإن بروكسيمول مركب يعمل كمطهر للمسالك البوليه لإحتوائه على مادة الهيكسامين التي تطلق الفورمالدهيد في البول، والفورمالدهيد له مفعول مضاد لكثير من البكتريا التي تسبب عدوى الجهاز البولى.

دواعى الإستعمال :

- كطارد لحصوات الحالب.

- وجود بللورات حمض اليوريك وأملاح اليورات بكثرة في البول.

- عدوى الجهاز البولى مثل التهاب حوض الكلى، التهاب المثانة، التهاب قناة مجرى البول.

الأعراض الجانبية :

نادراً ما قد يحدث غثيان.

نواهي الإستعمال :

- فرط الحساسية لأى من مكونات المستحضر.

- خلل وظائف الكلى أو الكبد.

الإستعمال أثناء الحمل :

في حالات الحمل لم يثبت بعد مدى أمان بروكسيمول مركب . لهذا فمن المفضل عدم إستعماله أثناء الشهور الثلاثة الأولى من الحمل ككثير من الأدوية الجديدة.

إحتياط :

بعض مركبات السلفا النادرة الإستعمال مثل السلفا ميثيزول والسلفا ثيازول قد يكونوا رواسب غير قابلة للذوبان في البول وذلك بتفاعلهم مع الفورمالدهيد الناتج - لذا لا ينصح بإستعمال المستحضرات التي تحتوى على هيكسامين في نفس الوقت مع مركبات السلفا السابق ذكرها.

الجرعة :

٢ ملعقة صغيرة (أو كيس) في نصف كوب ماء ثلاث مرات يومياً بعد الأكل حسب ما يوصى به الطبيب.

تحذير :

لا يستعمل إلا تحت إشراف الطبيب.

ملاحظة :

ينصح المرضى المصابون بحصوات الجهاز البولى بتناول كميات كبيرة من السوائل لتساعد على طرد تلك الحصوات.

العبوة :

- زجاجة مشمعة تحتوى على ٦٠ جرام.

- أكيس بكل منها ٥ جرام (علية تحتوى على ١٢ كيس).

الحفظ :

يحفظ تحت ٢٥° م بعيداً عن الرطوبة.

