



بوسكوبان

هايسين - ن - بيوتيل بروميد



الخواص :

ذو تأثير خاص على العقد العصبية الباراسيمباثوية الموجودة في جدران الأوعية ولهذا فيوسكوبان له تأثير خاص مضاد للتشنج والتأصل في العضل الأملس الخاص بالجهاز المعدي المعوي والمسالك المرارية والبولية . وليس لبوسكوبان أية أعراض جانبية على الجهاز العصبي المركزي أو العين أو غد الغدد أو القلب ، متى أعطى في حدود الجرعات العلاجية .

حالات الإستعمال :

التقلصات الخاصة بالجهاز المعدي المعوي ، و تقلص فتحة البواب عند الأطفال ، القيء الذي يحدث عقب العمليات الجراحية ، الإمساك التلقضي ، عدم قدرة المجارى المرارية على القيام بالحركات الإرادية ، و تقلصات المجارى البولية ، تأخر إرتخاء القسم الأسفل للرحم ، عسر الحيض .

الجرعة :

للبالغين و أولاد المدارس : الجرعة العادية هي قرص إلى قرصين (أقراص مغلقة بالسكر) ، أو ١ - ٢ لبوس (١٠ ملليجرام في اللبوس) تعطى من ٣ - ٥ مرات يوميا . و يمكن للطبيب زيادة هذه الجرعات . و يجب بلع الأقراص صحيحة كما هي مع قليل من الماء . أما اللبوس فينزع عنه الغطاء و يدخل الجزء المذهب منه أولاً في الشرج . و في حالات المغص الحادة تعطى حقنة واحدة (٢٠ ملليجرام) تحت الجلد ، في العضل ، أو في الوريد بضع مرات يوميا . و في حالات المغص المرارى أو الكلوى الحاد يمكن إعطاء حقنة من بوسكوبان كومبوزيتم في الوريد ببطء و في الحال يخفئ الألم الشديد .
للأطفال و الرضع : لبوس واحد (أطفال) ٣ مرات يوميا . و في الحالات الحادة يمكن إعطاء $\frac{1}{4}$ حقنة ٣ مرات يوميا

العبوات :

أقراص مغلقة بالسكر	١٠ ملليجرام
لبوس للكبار	١٠ ملليجرام
لبوس أطفال	٧,٥ ملليجرام
أمبول	٢٠ ملليجرام
علبة ٢٠ قرص	
علبة ٦ لبوس	
علبة ٦ لبوس أطفال	
علبة ٦ حقن	

الحفظ :

يحفظ في درجة حرارة الغرفة (١٥ - ٣٠) °م في مكان بارد وجاف .

إنتاج : شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)

جيزة - ج.م.ع. - س.ت. ١٩٧١٧

بتصريح من : بورينجر إنجلهايم إنترناشيونال ليمتد

إنجلهايم أم راين - ألمانيا