



بيكوزيم

محلول في امبولة صالح للحقن

التركيب:

كل امبولة محلول صالح للحقن، من 2/2 مل، تحتوي على:

- عناصر فعالة:
- فيتامين ب 1 / B1 (كلوهيدرات الثيامين) 10/10 ملغ
- فيتامين ب 2 / B2 (ريبوفلافين فوسفات الصوديوم) 5,47/5,47 ملغ
- فيتامين ب ب / PP (نيكوتيناميد) 40/40 ملغ
- فيتامين ب 6 / B6 (كلوهيدرات البيريدوكسين) 4/4 ملغ
- فيتامين ب 5 / B5 (دكسيانثينول) 6/6 ملغ

- سسواغات: فنول، حمض كلوهيدريك مركز، ماء لتحضير محلول صالح للحقن.

اشكال التقديم المتوفرة:

علبة تحتوي على 12/12 امبولة، من 2/2 مل الامبولة.
علبة تحتوي على 6/6 امبولات، من 2/2 مل الامبولة (لاجل المستشفيات فقط)

الصف الصيدلي العلاجي المنتمي اليه بيكوزيم:

فيتامينات
(A/1): الجهاز الهضمي والاستقلاب).

المستثمر:

باير سا نتيه فاميليال. ٣٣، شارع الأندستريه - ٧٤٢٤٠ جايار. فرنسا.
Bayer Santé Familiale - 33, rue de l'Industrie - 74240 Gaillard - France
الصانع: سنيكسي. ٥٢، شارع مارسيل و جاك جوشيه. ٩٤١٢٢ فنتونييه. سو. بوا سيكس. فرنسا.
Cenexi - 52, rue Marcel et Jacques Gaucher - 94122 Fontenay-sous-Bois Cedex - France

دواعي الاستعمال:

يُصح بهذا الدواء للوقاية من العوز في الفيتامين ب / B بانواعه، عندما تكون التغذية عن طريق الوريد حصراً.

موانع الاستعمال:

هذا الدواء يجب الامتناع عن استعماله:

- في حال سوابع اوجبة (حساسية) تجاه أحد مكوناته.
- لدى تناول ليفودوبا.

الاحتياطات لدى الاستعمال:

في حال الشك، لا ترددوا في استشارة الطبيب او الصيدلي.
التفاعلات بين الادوية وتفاعلات اخرى:
هذا الدواء يحظر تناوله مع اليفودوبا.
بغية تفادي تفاعلات محتملة بين عدة ادوية، يجب حتماً احاطة الطبيب او الصيدلي علماً بكل علاج آخر يخضع له المريض.
الحمل - الإرضاع:
بصورة عامة، ينبغي دائماً، اثناء فترة الحمل وفترة الارضاع، استشارة الطبي او الصيدلي، قبل تناول دواء ما.

كيفية الاستعمال:

المقادير:
امبولة واحدة حتى امبولتين اثنتين في اليوم.
قد تم وصف هذا الدواء لك في حالة معينة.
- لا يمكن تركيبه وفق حالة اخرى.
- ننصح به شخصياً آخر.
كيفية تناول الدواء:
عن طريق العضل، او الوريد، او بالثروية عبر الوريد.

التأثيرات المحتملة غير المرغوب فيها التي قد تنشأ عن تناول بيكوزيم:

ان هذا الدواء، مثل كل مستحضر، قد يؤدي عند بعض الاشخاص الى تأثيرات متفاوتة الازعاج:

- نقص الضغط الشرياني.
- تلون البول باللون الاصفر.
- نادراً: اعراض جلدية، وبصورة استثنائية: ارجية (تحسس) حادة.
- اعراض عصبية استثنائية، تتلاشى لدى ايقاف المعالجة على اثر جرعات شديدة، او / وفترات استشفاء طويلة.

يجب احاطة الطبيب أو الصيدلي علماً بأي تأثير مزعج وغير مرغوب فيه لا يكون ذكره وارداً في هذه المذكرة.

الحفظ؟

لا تتجاوزا التاريخ الأقصى للاستعمال المذكور بوضوح على الغلاف.
ينبغي حفظ هذا الدواء في حرارة دون 25 / 25 درجة مئوية.

لا تترك الادوية أبداً في متناول الأطفال

تاريخ مراجعة هذه المذكرة:

يونيو 2005 / ٢٠٠٥

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال التي أوعز بها.
- إتبع نصائح الصيدلي.
- الطبيب والصيدلي هما خبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة المعالجة المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تعاود تناول الدواء ولا تزد المقادير بدون استشارة الطبيب.