

سيفيترياكسون صوديوم

سيفيترياكسون، للحقن العضلي والوريدي
نشرة داخلية - معلومات للمريض.

- زوراكسون ٥٠٠ مجم للحقن العضلي. - زوراكسون ٥٠٠ مجم للحقن الوريدي.
- زوراكسون ١ مجم للحقن العضلي. - زوراكسون ١ مجم للحقن الوريدي.
١. رجاءاً اقرأ هذه النشرة بعناية قبل بدء استعمالك لهذا الدواء.
٢. احتفظ بهذه النشرة، ربما تحتاج إلى إعادة قرائتها مرة أخرى. لو كان لديك أي أسئلة إضافية، اسأل طبيبك.
٣. إذا تفاديت معك أي من الآثار الجانبية، أو أصبحت أكثر شدة، أو لاحظت أي أثر جانبي غير متكرر في هذه النشرة، رجاءاً أخبر طبيبك.
في هذه النشرة:
١. ماهو مستحضر زوراكسون؟، وفيما يستعمل؟.
٢. قبل استعمالك لمستحضر زوراكسون.
٣. كيف يستعمل مستحضر زوراكسون؟.
٤. الآثار الجانبية المحتملة.
٥. كيف يحزن مستحضر زوراكسون؟.
٦. معلومات إضافية.

١. ماهو مستحضر زوراكسون؟، وفيما يستعمل؟.

زوراكسون دواء يحتوي على مادة سيفيترياكسون، والتي تنتمي للمضادات الحيوية. يستعمل زوراكسون لعلاج حالات العدوى المسببة بالبكتيريا.
يمكن أن يستعمل زوراكسون لعلاج العدوى في أي جزء من جسم الإنسان (بما في ذلك العينين، الأنف، الحنجرة، الجلد، والأعضاء الجسم الخروء الأخرى (الجلد)، والعظم والعضو مثل التهاب السحايا والميلان (عدوى تنتقل جنسياً). من الممكن أن يستعمل زوراكسون لعلاج العدوى في الأشخاص المصابين بنقص خلايا الدم البيضاء. من الممكن أيضاً أن يستعمل زوراكسون قبل وبعد العمليات الجراحية لوقف حدوث العدوى. زوراكسون يعمل على منع نمو البكتيريا، مما يؤدي إلى موتها.

٢. قبل استعمالك لمستحضر زوراكسون:

لا يجب أن تستعمل زوراكسون في الحالات الآتية:

- إذا كانت لديك فرط الحساسية لمادة سيفيترياكسون (المكون الوحيد للزوراكسون) أو لأي سلفاميد أو لأي من السواغ.
- إذا كانت لديك فرط الحساسية للمضادات الحيوية المسماة بـ "السلفاميد"، والتي تتضمن سيفاكسون، سيفاكلور وسيفيوروكسيم.
- إذا كنت قد تعرضت لتفاعلات حساسية شديدة و مفاجئة من البنسيلين، أو من مضادات حيوية مشابهة تحتوي على بيتا - لاكتام (مثل الأموكسيسيلين أو فلوكلوكساسيلين). علامات الحساسية تتمثل في: تورم مفاجئ بالحنك والوجه والذي قد يؤدي لصدومية في التنفس أو البقع، تورم مفاجئ باليدين والقدمين والكاحلين، وطفح جلدي شديد والذي يتطور سريعاً.

- إذا كنت متحسناً (لديك فرط حساسية) لمادة ليدوكاين ومن المفترض أن تستعمل زوراكسون للحقن العضلي. لا يجب أن تستعمل زوراكسون في حالة إذا كانت أي من تلك الحالات تطبق عليك، إذا لم تكن متأكد، تحدث مع طبيبك قبل استعمالك لزوراكسون.

يحظر خلط مادة سيفيترياكسون أو استعمالها متزامنة مع المحاليل أو المستحضرات المحتوية على كلسيوم، أو حتى عن طريق الإبراء الوريدي المنفصل.

يحذر استعمال المحاليل أو المستحضرات المحتوية على كلسيوم خلال ٤٨ ساعة من آخر استعمال لجرعة سيفيترياكسون، وذلك لأنه قد سجلت بعض حالات لويقات من الأطفال حديثي الولادة نتيجة لتكوين رسوب من الكلسيوم - سيفيترياكسون في الرئة والكلى.

لا يجب إعطاء زوراكسون للأطفال حديثي الولادة في الحالات الآتية:

- الأطفال المصابين (غير مكتملي النمو).
- الأطفال حديثي الولادة (حتى ٢٨ يوم) المصابين ببعض المشاكل في الدم، أو الصفراء (اصفرار لون الجلد وبياض العينين)، أو إذا كانوا على وشك استعمال حقن على كلسيوم.
تحذيرات واحتياطات خاصة للإستعمال:
راجع مع طبيبك قبل استعمالك لزوراكسون في الحالات الآتية:
- إذا كنت قد تعرضت لتفاعلات حساسية بسيطة أو شديدة من البنسيلين، أو من مضادات حيوية مشابهة تحتوي على بيتا - لاكتام لأن هؤلاء المرضى قد يعانون من حساسية عند إستخدامهم لزوراكسون (مثل طفح جلدي والذي قد تصاحبه حكة جلدية) أو لأي من السواغ.
- إذا كنت متحسناً لأي شيء غير مذكور في هذه النشرة.
- إذا كنت متحسناً بالربو.
- إذا كنت قد تلقيت حديثاً أو كنت على وشك تلقي علاجاً يحتوي على كلسيوم.

- إذا كنت تعاني من مشاكل بالأعضاء، وخاصة التهاب الأمعاء.

- إذا كنت تعاني من مشاكل بالكبد أو الكلىتين.
- إذا كنت تعاني من أمراض أخرى مثل مشاكل بالدم.
- إذا كنت تخضع لحمية غذائية منخفضة الصوديوم.
- إذا كانت أي من تلك الحالات تطبق عليك، أو إذا لم تكن متأكد، تحدث مع طبيبك قبل استعمالك لزوراكسون.

يجب أخذ احتياطات خاصة عند استعمال زوراكسون، ويجب تحديد ما إذا حدثت تفاعلات حساسية من قبل عند استعمال البنسيلين أو لأي مضادات مشابهة تحتوي على بيتا - لاكتام لأن هؤلاء المرضى قد يعانون من وجود حساسية للسيفيترياكسون.

زوراكسون دواء آخرى رجاءاً أخبر طبيبك إذا كنت قد استعملت قريباً أي أدوية أخرى ويتضمن ذلك الأدوية التي قد حصلت عليها بدون وصفة طبية أو أدوية عشبية، فقد يؤثر زوراكسون على طريقة عمل هذه الأدوية، وكذلك قد يؤثر بعض هذه الأدوية على عمل زوراكسون. على وجه الخصوص، أخبر طبيبك إذا كنت تستعمل أي من الأدوية التالية:

أفراص عمل الحمل، زوراكسون يوقف طريقة عمل أفراص منع الحمل، لذلك يجب استعمال عازلات إضافية لمنع الحمل (الوقيات الذكرية) أثناء استعمال زوراكسون، ولعدة أشهر بعد انتهاء العلاج. كلورامفينيكول (دواء يستعمل لعلاج العدوى البكتيرية وخاصة عدوى العين)، موانع تليط الدم (أدوية تستعمل لزيادة سيولة الدم)، بروبيونيد (دواء يستعمل لعلاج القرحة)، أماسكرين (دواء مضاد للسرطان)، فلوكونازول (دواء مضاد للفطريات)، فلوكتاميسين أو المضادات الحيوية الأخرى (تستعمل لعلاج العدوى).

الحمل و الرضاعة تحتوي مع طبيبك قبل استعمالك لهذا الدواء إذا كنت حاملاً، أو إذا كنت تتوقعين حدوث حمل، أو إذا كنت تتوقعين بالرضاعة. قد يسبب زوراكسون بوخة. أخبر طبيبك إذا حدث لك هذا، ولا تقم بقيادة سيارة أو استعمال أي أدوات أو ماكينات.

٣. كيف يستعمل مستحضر زوراكسون؟: يتم حقن زوراكسون لك بواسطة طبيب أو ممرضة سوف يتم حقنك بطريقة من اللتين:

- الحقن في عضلة (مثل عضلة الساعد).
- الحقن البطني في الوريد. في خلال فترة من ٢ - ٤ دقائق.
الحقن من خلال أنبوب صغير مركب بالوريد. تسمى هذه الطريقة بـ "الإبراء الوريدي"، وتستغرق هذه الطريقة ٣٠ دقيقة على الأقل.

إن عند الأبرام أو الأسابيع التي يتم استعمال زوراكسون فيها تعتمد على نوعية وشدة العدوى لديك. عادة ما تستمر في استعمال زوراكسون لثلاثة

البالغين وكبار السن والأطفال من عمر ١٢ سنة فأكثر
- الجرعة الاعيادية ١ جم مرة واحدة يومياً، في حالة العدوى الشديدة، من الممكن أن يعطيك الطبيب جرعة أعلى (من ٤-٢ جم مرة واحدة يومياً).
- إذا كنت ستقوم بإجراء جراحة فقد تستعمل جرعة من ٢٠١ جم في حقنة واحدة أو حقنتين.
- الجرعة الاعيادية للعدوى المسماة بـ "السيلان" هي ٢٥٠ مجم كجرعة واحدة، تحقن بالعضل.

الأطفال حتى عمر ١٢ سنة تعتمد الجرعة التي يقرها الطبيب على وزن جسم الطفل. تعطى جرعة زوراكسون للطفل مرة واحدة يومياً من خلال أنبوب صغير مركب بالوريد "الإبراء الوريدي"، وعادة تستغرق هذه الطريقة ٣٠ دقيقة على الأقل.

الأطفال حديثي الولادة تعتمد الجرعة التي يقرها الطبيب على وزن جسم الطفل. تعطى جرعة زوراكسون للطفل مرة واحدة يومياً من خلال أنبوب صغير مركب بالوريد "الإبراء الوريدي"، وعادة تستغرق هذه الطريقة ساعة واحدة.

الأشخاص المعصنين بمشاكل في الكبد والكلى
- إذا كنت مصاب بمشاكل في الكبد والكلى، قد تستعمل جرعة أقل، وقد تحتاج لعمل اختبارات لمعرفة ما إذا كنت تستغرق هذه الطريقة ساعة واحدة. إليك بتركيز المناسب.

- إذا كنت قد استعملت جرعة زائدة من زوراكسون وإذا كنت تعتقد أنك قد استعملت جرعة زائدة من زوراكسون، أخبر طبيبك.

إذا كنت ترى أسئلة إضافية، اسأل طبيبك.

٤. الآثار الجانبية المحتملة:
مثل كل الأدوية، من الممكن أن يسبب مستحضر زوراكسون آثاراً جانبية، ورغم ذلك فهي لا تحدث لكل مستعملي الدواء.

الآثار الجانبية الشائعة التي تحدث مع هذا الدواء:
تفاعلات حساسية شديدة (غير شائعة، تؤثر على أقل من ١ من كل ١٠٠ شخص)
إذا كان لديك تفاعلات حساسية شديدة، أخبر الطبيب على الفور. تتضمن العلامات: تورم مفاجئ بالوجه، الطاق، الشفتين أو الفم. تورم مفاجئ باليدين، القدمين والكاحلين.

تفاعلات جلدية شديدة (نادرة جداً، تؤثر على أقل من ١ من كل ١٠٠٠٠ شخص).
إذا كنت لديك تفاعلات جلدية شديدة، أخبر الطبيب على الفور.

تضمن العلامات: طفح جلدي شديد والذي يتطور سريعاً، مع تورم وتقرح بالجلد مع احتفالية حدوث تورم بالرقم.

آثار جانبية أخرى محتملة حدوث: شعاع، (تؤثر على أقل من ١ من كل ١٠ أشخاص).
شئ في البراز أو إسهال، إحساس بخن أو قيء.

- غير شعاع، (تؤثر على أقل من ١ من كل ١٠٠ شخص):
تفاعلات جلدية أخرى، تتضمن: طفح جلدي والذي قد يغطي مساحة كبيرة من الجسم، ارتكباباً، الإحساس بحكة وتورم.

نادرة، (تؤثر على أقل من ١ من كل ١٠٠٠ شخص): أنواع أخرى من العدوى، مثل تلك تسببها الفطريات والخمائر.

مشاكل تشبه تلك التي تحدث في: الإحساس بالتهب، سهولة الإصابة بكمات، قشر الفم ونزيف بالأنف.

صعاب - الإحساس بدوار - حرقة بالرقم

- التهاب بالسان، حمى، حرقن بالسان - مشاكل بالكبد (تظهر باختبارات الدم)

- مشاكل بحموضة المرئية والتي قد تسبب ألم إحساس بخن أو قيء - مشاكل بالكلى، قد تتأثر كمية البول التي تتخلص منها يومياً.

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

- تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول - تورم أو احتقان في البول

