

التركيب: تحتوي كل فيال على ٢٥٠ مجم، ٥٠٠ مجم، ١ جم و ٢ جم سيفاكون (على هيئة سيفترياكسون صوديوم) معلومات للمرضى: سيفاكسون فيال ٢٥٠ مجم، ٥٠٠ مجم، ١ جم و ٢ جم بوردرة نحل للحقن أو المحاليل الوريدية سيفترياكسون (سيفترياكسون ثنائي الصوديوم مائي)

- من فضلك اقرأ النشرة كاملة ومبأبة قبل تناول الدواء - احتفظ بهذه النشرة قد ترغب في قرائتها مرة أخرى فيما بعد - إذا كان لديك أي استفسارات إضافية يرجى استشارة طبيبك أو الممرضة - إذا شعرت بأي من الآثار الجانبية بصورة شديدة أو متقلبة أو إذا لاحظت أي أعراض جانبية غير مذكورة في هذه النشرة ترجوا استشارة طبيبك أو الممرضة.

في هذه النشرة: ١- ما هو سيفاكسون ولأي غرض يستعمل ٢- ما الذي يجب مراعاته قبل تناول سيفاكسون ٣- كيف يجب تناول سيفاكسون ٤- الآثار الجانبية المحتملة حدوثها ٥- كيف يجب تخزين سيفاكسون ٦- معلومات أخرى ما هو سيفاكسون ولأي غرض يستعمل؟ يحتوي سيفاكسون على دواء يسمى سيفترياكسون. وينتمي إلى مجموعة دوائية تسمى المضادات الحيوية يستعمل سيفاكسون لعلاج العدوى التي تسببها البكتيريا.

يمكن استعماله لعلاج العدوى في مختلف أعضاء الجسم ويشمل ذلك الرئتين (الالتهاب الرئوي)، الدم (التسمم الدموي)، الجلد، أجزاء الجسم الرخوة (الأنسجة)، العظام كما يستعمل لعدوى أخرى مثل التهاب السحايا والسيلان (عدوى تنتقل عن طريق العلاقة الجنسية). يمكن استعماله لعلاج العدوى في المرضى الذين يعانون من نقص في خلايا الدم البيضاء. يمكن استعماله قبل وبعد عمليات الجراحية لمنع حدوث العدوى.

يعمل سيفاكسون عن طريق منع البكتريا من النمو بطريقة طبيعية مما يؤدي إلى قتلها. **ما الذي يجب مراعاته قبل تناول سيفاكسون:** لا يجب استعمال سيفاكسون إذا: • إذا كان لديك حساسية من سيفترياكسون المادة الوحيدة في سيفاكسون • إذا كان لديك حساسية من المضادات الحيوية من مجموعة (السيفالوسبورينز) وتشمل سيفاكسون، سيفالورام، سيفوروكسيم. إذا كنت قد تعرضت لتفاعل حساسية مفاجئ وخطير بسبب التسنين أو المضادات الشاهية له مثل الأموكسيسيلين أو الفلوكسلوكسيلين، تشتمل الأعراض تورم مفاجئ في الحلق أو الوجه مما يسبب صعوبة في التنفس أو ألم تورم صانج باليدين والقدمين والكدمات وتظهر قطفح حطبي على الجلد يتغير سريعاً • إذا كنت لديك حساسية من الليثيوم وكان عليك أن تتناول سيفاكسون بالحقن العضلي • إذا كان تطبيق عليك أي من السابق لا يجب عليك تناول سيفاكسون. وفي حالة عدم تأكدك يجب عليك التحدث مع طبيبك أو الممرضة قبل تناول سيفاكسون.

لا يجب إعطاء سيفاكسون للرضع (١٤): الرضع المبتسرين • حديثي الولادة (حتى ٢٨ يوم) ولديه بعض مشاكل في الدم أو يعاني من الصفراء (وهو أصفرار في لون الجلد أو بياض العين) وإذا كان عليه أن يحضن بدواء آخر يحتوي على الكالسيوم. **يرجاء الابتهاية به:** تأكد من طبيبك أو الممرضة قبل تناول سيفاكسون إذا كنت قد ظهرت عليك أعراض حساسية بسيطة للبنتسلين أو المضادات المشابهة (مثل طفق جلدي تصحبه حكة) • إذا كانت لديك حساسية من أي شئ غير مذكور في هذه النشرة • إذا كنت تعاني من أي مشاكل في جهازك الهضمي وخاصة التهاب القولون • إذا كنت تعاني من أي مشاكل بالكبد أو الكلى • إذا كنت تعاني من أمراض مثل أمراض الدم • إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً منخفض الصوديوم. إذا كان تطبيقك عليك أي من السابق أو إذا لم تكن متأكدًا تحدث إلى طبيبك أو الممرضة قبل تناول سيفاكسون.

في حالة تناول أدوية أخرى: من فضلك أخبر طبيبك المعالج أو الممرضة عن أي أدوية أخرى تتناولها أو تتناولها حديثاً هذا يشمل أيضاً الأدوية التي تشتريها بدون وصفة والأعشاب الطبية ذلك لأن سيفاكسون يمكن أن يؤثر على مفعول بعض الأدوية كذلك فإن بعض الأدوية يمكنها أن تؤثر على عمل سيفاكسون وعلي وجه الخصوص بجرء إخبار طبيبك أو الممرضة إذا كنت تتناول أي من الأدوية التالية: اقراص منع الحمل - سيفاكسون يمكن أن يقلص عمل هذه الأقراص لذلك يجب استعمال وسيلة أخرى لمنع الحمل (مثل الواقي الذكري) أثناء تناول سيفاكسون ولمدة شهر بعدها • كبروفينيكول (المستخدم لعلاج العدوى خاصة في العين) • موانع التجلط (أدوية تستعمل لمنع تجلط الدم) • برونيسيد (يستعمل لعلاج التقرس) • امسكارين (دواء لعلاج السرطان) • فلوقازونول (دواء مضاد للفطريات) • فانكومايسين أو أي مضادات حيوية أخرى (لعلاج العدوى).

الرجوع والرعاية: أخبر طبيبك قبل تناول الدواء إذا كنت حامل أو عن احتمال وجود حمل أو إذا كنت ترضعين طفلك. **القيادة وتشغيل الآليات:** سيفاكسون يمكن أن يسبب دوار. تحدث إلى طبيبك إذا ما حدث ذلك ولا تقود ولا تستعمل أي ماكينات أو معدات • **كيف يجب تناول سيفاكسون:** الطبيب أو الممرضة سيقيم بعطائك سيفاكسون وذلك عن طريق أحد الطرق التالية: • الحقن العضلي (مثل عضلة الذراع) • الحقن اللمفي في أحد الأوردة ويستغرق ذلك من ٢-٤ دقائق • من خلال أنبوب صغير في أحد الأوردة ويسمى ذلك محلول وريدي وقد يستغرق ٢٠ دقيقة على الأقل ويؤخذ عدد الأيام أو الأسابيع التي تتناول فيها سيفاكسون على نوع العدوى التي تشكو منها وعادة تستمر في تناول سيفاكسون ليومين أو ثلاثة أيام بعد شفاك من المرض. **التفاعلات:** والمسنين والأطفال من ١٢ سنة فأكثر: الجرعة المعتادة هي ١ جم مرة واحدة يومياً في حالة كسري خطيرة يمكن تطبيق ١٠ يعطي جرعة غير

يبدأ (٢ و ٣ جم مرة واحدة يومياً) إذا كنت ستعمرض لجراحة يمكن أن تعطي ما بين ١ جم و ٢ جم بالحقن على مرة واحدة أو مرتان العلاج المعتاد لعدوى (السيلان) هو جرعة واحدة ٢٥٠ مجم تعطي بالحقن العضلي **الأطفال حتى ١٢ سنة:** يقوم الطبيب بحساب الجرعة تبعاً لوزن الطفل ويعطي الدواء للطفل مرة واحدة يومياً من خلال أنبوب صغير في الوريد (محلول وريدي) ويستغرق ذلك على الأقل ٣٠ دقيقة **حديثي الولادة:** يقوم الطبيب بحساب الجرعة تبعاً لوزن الرضيع وتعطي له الجرعة مرة واحدة يومياً من خلال أنبوب صغير في الوريد (محلول وريدي) ويستغرق ذلك ساعة

الرضى الذين يعانون من مشاكل في الكبد والكلى: إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد والكلى فيمكن أن تعطي جرعة أقل ويمكن أن تحتاج إلى عمل تحاليل بالدم لتأكد من حصولك على الجرعة المناسبة. إذا تم إعطائك كمية أكبر من السيفاكسون، إذا كنت تعتقد أنه تم إعطائك كمية أكبر من سيفاكسون أخبر بذلك الطبيب المعالج أو الممرضة. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن استعمال هذا الدواء استشر طبيبك أو الممرضة.

٤- الآثار الجانبية المحتملة حدوثها: مثل كل الأدوية يمكن لسيفاكسون أن يسبب آثار جانبية ولكنها لا تحدث لكل المرضى. الآثار الجانبية التالية يمكن أن تحدث مع هذا الدواء: • تفاعلات حساسية خطيرة (غير معتادة، تحدث لأقل من ١ في ١٠٠ شخص) إذا شعرت بتفاعلات حساسية خطيرة أسرع بإخبار الطبيب المعالج وأعراضها تشمل: - التورم المفاجئ في الوجه والحلق والشفة أو التمذ قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس أو البقع - التورم المفاجئ في اليدين والقدمين. - طفق جلدي شديد (نادر جداً، يحدث لأقل من ١ في ١٠٠٠ شخص). إذا حدث طفق جلدي شديد أسرع بإبلاغ الطبيب المعالج وتشتمل الأعراض طفق جلدي شديد يتغير سريعاً مع تكون حويصلات أو قشر للجلد واحتمال تكون حويصلات بالدم.

أثار جانبية أخرى محتملة: معتادة (نسبة أقل من ١ في ١٠ أشخاص): - ليونة في البراز أو إسهال - شعور بالتعب غير معتادة (نسبة أقل من ١ في ١٠٠ شخص) - جلدية: وتشتمل طفق يمكن أن يظهر في مساحات كبيرة من الجسم - بقع مرتفعة، الشعور بحكة وتورم - نادرة: (نسبة أقل من ١ في ١٠٠٠ شخص) - أنواع أخرى من العدوى مثل الفطريات والخمائر (كثاني تحدث في الفم) - مشاكل بالدم: شعور بالتعب، سهولة ظهور كدمات، صعوبة في التنفس، نزيف من الأنف - صداع - شعور بالدوار - التهاب بالدم - التهاب في اللسان: ألم واحمرار وآلم في اللسان - مشاكل في الكبد تظهر في تحاليل الدم - مشاكل في الجوصلة المرارية تسبب الألم وشعور بالتعب. - مشاكل للكلى: شعور في كدمات البول، بعض المرضى يعانون من قلة كمية البول ونادراً جداً ما يحدث توقف للبول تماماً - ظهور سكر أو دم في البول - ألم وشعور بحرقان في الوريد الذي تم حقن سيفاكسون به - ألم في موضع الحقن - ارتفاع في الحرارة ورعشة نادراً جداً (نسبة أقل من ١ في ١٠٠٠ شخص). - يعطي اختبار كومبز نتيجة إيجابية (هو اختبار لبعض مشاكل الدم). - مشاكل متقلبة بتجلط الدم. يتجلط الدم. تظهر في سهولة ظهور كدمات ووجود ألم وتورم في المفاصل - تغير في عدد كرات الدم البيضاء وتشتمل الأعراض ارتفاع مفاجئ في الحرارة ورعشة. ألم في الحلق. - التهاب في البنكرياس وتشتمل الأعراض شديدة في المعدة تنتشر إلى الظهر

- التهاب القولون وتشتمل الأعراض الإسهال عادة يصاحب دم ومخاط ألم في المعدة وحمى، إذا ظهر أي من هذه الآثار الجانبية بصورة شديدة ومثيرة للقلق أو إذا لاحظت أي آثار جانبية أخرى لم تذكر في هذه النشرة عليك باستشارة طبيبك المعالج أو الممرضة. **٥- كيف يجب تخزين سيفاكسون:** هي مستوية الطيب أو الصيدلي وعليهم أيضاً مسئولية التخلص بطريقة سليمة من السيفاكسون الغير مستعمل - احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال - لا تحفظ سيفاكسون في درجة حرارة أعلى من ٢٥° - لا تستعمل سيفاكسون بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة. **٦- معلومات أخرى:** على ماذا يحتوي سيفاكسون؟ المادة الفعالة في بوردرة سيفاكسون بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة. في فيال زجاجي يحتوي على ٢٥٠ مجم، ٥٠٠ مجم، ١ جم و ٢ جم من السيفترياكسون، لا يوجد أي مكونات أخرى في سيفاكسون، ما هو شكل سيفاكسون ومحتويات العبوة: عليه كرتون يحتوي على ١ فيال ٢٥٠ مجم، ٥٠٠ مجم للحقن العضلي + ١ فيال ٢٠٠ مجم من الليثيوم، نشرة داخلية وعلبة كرتون تحتوي على ١ فيال ١ جم للحقن العضلي + ١ أمبول ٢.٥ أمبول ١ أمبول ١ فيال ١ جم للحقن الوريدي + ١ أمبول ٥ مل ماء للحقن الوريدي + ٤ أمبول ٥ مل ماء للحقن، نشرة داخلية، قبل إعطائه للمريض يتم تحويله إلى محلول بإضافة سائل معقم إلى الفيال ثم سحب الكمية المطلوبة من الفيال وتعطي للمريض بالحقن أو بالإضافة إلى محلول وريدي يعطي من خلال أنبوب صغير في الوريد. **احتياطات خاصة بالتخزين:** لا يخزن عند أكثر من ٢٠° في مكان جاف. **التخزين بعد الحل:** يحفظ في درجة حرارة ٢-٨ درجة مئوية للإستخدام خلال ٢٤ ساعة.

صنع في مصر شركة فاركو بس العالمية الإسكندرية