

ناديورابولين ٢٥ مجم ، ٥٠ مجم / مللى

هذا المستحضر يحتوي على كحول بنزلي و الذي قد يسبب الوفاة للرضع والأطفال حديثي الولادة.



يجب قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى ، اطلب من الطبيب أو الصيدلي.
- هذا الدواء قد تم وصفه لك ، لا تقوم بوصفه لآخرين. قد يحدث ضرر لهم ، حتى لو كانت الأعراض متشابهة.
- إذا تطورت أي من الآثار الجانبية و أصبحت خطيرة أو لاحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة ، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة :

- ١- ما هو ناديورابولين وفيما يستخدم
- ٢- قبل إعطاء ناديورابولين
- ٣- كيف تتناول ناديورابولين
- ٤- الآثار الجانبية المحتملة
- ٥- كيفية تخزين ناديورابولين
- ٦- معلومات إضافية

١- ما هو ناديورابولين وفيما يستخدم

ناديورابولين هو محلول للحقن يحتوي على المادة الفعالة ناندرونول ديكاتويل. الناندرونول هو نوع من الإستيرويدات الستيرويدية التي تساعد على منع هشاشة العظام. يستخدم ناديورابولين في هشاشة العظام ، عندما تصحح العظام رقيقة هشّة بعد انقطاع الطمث.

٢- قبل إعطاء ناديورابولين

- لا تأخذ ناديورابولين:

إذا كنت تشكو من حساسية للناندرونول ديكاتويل أو أي من مكونات المستحضر.

إذا كنت تعاني من سرطان الثدي أو البروستاتا.

إذا كنت تعاني من البورفيريا (اضطرابات الدم الوراثية).

لابد من رعاية خاصة مع ناديورابولين.

- تحذيرات:

هذا المستحضر يحتوي على كحول بنزلي والذي يعتبر شديد السمية إذا ما استخدم موضعياً في الأنسجة النسيجية كما يحتر استخدامه للأطفال المبتسرين لإحتوائه على الكحول البنزلي.

- مواقع الاستعمال:

الحمل، الإهمات المرضعات و الأطفال: لا تستخدم هذه الحقنة " لأنها تحتوي على كحول بنزلي كمادة حافظة " لكل من حديثي الولادة ، الأطفال الأقل من ١٢ سنة ، السيدات الحوامل والمرضعات ، حيث أن الكحول البنزلي يتسبب في حدوث أعراض جانبية خطيرة خاصة عند الأطفال (قد يسبب صعوبة في التنفس) . لهذا يجب أن يستخدم في هذه الحالة حقن خالية من الكحول البنزلي من الضروري في بعض الحالات إشراف إضافي من الطبيب ، خاصة في المبتسرين.

- أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من:

أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الصرع، الصداع النصفي، ارتفاع ضغط الدم، سرطان العظام، داء السكري.

لا ينبغي للرياضيين أن يأخذوا الإستيرويدات البنائية لمحاولة تحسين الأداء لأن هذا قد يضرهم.

أخذ الأدوية أخرى:

قد تؤثر أدوية أخرى على كيفية عمل ناديورابولين أو يؤثر ناديورابولين على كيفية عمل هذه الأدوية والتي تشمل:

إذا كنت مصابا بمرض السكري قد تحتاج جرعة أقل من الأنسولين أو الأدوية الأخرى المضادة لمرض السكر . يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أو اتخذت مؤخرًا أي أدوية أخرى ، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية.

- الحمل والرضاعة الطبيعية:

يجب ألا يؤخذ ناديورابولين أثناء الحمل أو الرضاعة.

إسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

- القيادة واستخدام الآليات:

لا يوجد لدى ناديورابولين أي أثر ضار على اليقظة أو التركيز.

- معلومات هامة حول بعض مكونات ناديورابولين:

ناديورابولين يحتوي أيضًا على :

زيت الأراكيس: إذا كان لديك حساسية من الفول السوداني أو فول الصويا ، لا تستخدم هذا المنتج.

الكحول البنزلي: المنتجات التي تحتوي على الكحول البنزلي يجب ألا تعطى للأطفال غير مكتملي النمو لأنها من المحتمل أن تحدث تفاعلات سامة أو حساسية في الرضع والأطفال إلى سن ١٢ سنوات.

٣- كيف يتم إعطاء ناديورابولين

يحقن عادة ناديورابولين من قبل طبيب (أو ممرضة) في صورة حقن عميق في العضل وتعتمد الجرعة على درجة المرض والطبيب و الذي سوف يقرر الجرعة.

- إذا تناولت ناديورابولين أكثر من الجرعة المفروضة : إذا كنت تعتقد أنك أعطيت جرعة كبيرة من ناديورابولين أخبر الطبيب على الفور.

٤- الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يكون ناديورابولين له آثار جانبية ، إلا أنه ليس من الضروري أن تظهر هذه الأعراض على كل الأشخاص ، وهذه تشمل : احتجاز السائل، اختبارات الدم الغير طبيعية، توقف النمو عند الأطفال، زيادة في خصائص الذكورة في المراهقة ، صولته قد يكون أعمق وقد تلاحظ نمو بعض الشعر أو حب الشباب، زيادة الدفاع الجنسي ويمكن أن تتوقف الدورة الشهرية، وقد لوحظ في الفتيات الصغيرات وجود تغيير في البظر والعلامة ، نمو الشعر، وفي الرجال قد يحدث نقصان في كمية الحيوانات المنوية، وفي السيدات الصغار يمكن أن يتسبب ناديورابولين في نمو جنسي مبكر وتأخير في النمو. وإذا حدث ذلك قد تحتاج إلى وقف العلاج لفترة من الوقت.

قد تؤثر ناديورابولين على بعض اختبارات الكبد أو قد يسبب أورام الكبد ، ولكنها حالات نادرة جدا .

إذا أصيحت أي من الآثار الجانبية خطيرة ، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة ، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

٥- كيفية تخزين ناديورابولين

يحفظ بعيدا عن متناول وبصر الأطفال.

لا تستخدم ناديورابولين بعد انتهاء التاريخ المذكور على العبوة .

لا تقم بتخزينه فوق ٣٠ درجة مئوية.

لا تقم بتبريده أو تجميده.

احفظ الأمبولة في العبوة الخارجية.

لا ينبغي أن يتم التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اطلب من الصيدلي كيفية التخلص من الأدوية عند عدم الحاجة لها. هذه القياسات تساعد على حماية البيئة.

٦- معلومات إضافية

ماذا يحتوي ناديورابولين

المادة الفعالة الناندرونول ديكاتويل ٢٥ ملليجرام لكل مللى، ٥٠ ملليجرام لكل مللى.

وغيرها من المكونات هي : الكحول البنزلي وزيت الأراكيس.

ماذا يبدو ناديورابولين وما هي محتويات العبوة

ناديورابولين ٢٥ مجم ، ٥٠ مجم محلول للحقن: هو محلول مائل للاصفر وهو محلول زيتي معًا في ١مل أمبولة

زجاجية ويباع في عبوة بها أمبولة واحدة.

تصنع شركة تميمية الصناعات الكيماوية (سيدا)

لصالح شركة التليل للأدوية والصناعات الكيماوية

القاهرة - ج.م.ع - س: ١١٥٦٦٨

(إن هذا الدواء)

- دواء مستحضر على ياتر صحتك و معالجتك
- خلافا للتقاليد يرمك لتعطي
- اليه بقا وصحة طيبه، وطريقة الاستعمال
- محسوم عليها و تعالجت الصيانات قدرتها
- طبيب، و صيانتها مما يحسن بدارك
- وقته و حراره
- لا تقاوم مدة العلاج المدة لك من تلكه
- لا تحرق دواء الا تعالجت من قبله.

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

٣/١
٢٠١١/١٠
رقم الكود:
٢٣١٢٣٣ مجم
٢٣١٢٣٤ مجم