

## نيوروفيت أمبولات

يحتوى هذا الدواء على الكحول البنزليلى .  
لا يستخدم في حديثى الولادة والرضع .

## التركيب

يحتوى كل أمبول ٣ ملل على:

## المواد الفعالة:

ثيامين هيدروكلوريد ..... ١٥٠ مجم

بيريدوكسين هيدروكلوريد ..... ١٠٠ مجم

سيانوكوبالامين ..... ١ مجم

## المواد غير الفعالة:

كحول بنزليلى، بوتاسيوم فيروسيانيد، صوديوم

أسيئات، ماء للحقن

## دواعى الاستعمال:

يستعمل نيوروفيت للوقاية من امراض الاعصاب

المصاحبة لاضطراب وظائف التمثيل الغذائى

والتي تتأثر بنقص فيتامين ب١، أو ب١٢، أو ب٦، كما

فى حالات التهاب الاعصاب الطرفية الناتج عن

مرض السكر أو إدمان الكحوليات، أيضا ينصح

باستعمال نيوروفيت لعلاج التهاب اعصاب الحبل

الشوكى وآلام منطقة العمود الفقرى وعلاج الشلل

الخفيف بالوجه وأيضا الآلام الناتجة عن عرق

النسا أو الهريس زوستر .

## موانع الاستعمال:

لا يستعمل نيوروفيت أمبول فى حالة الشك بوجود

حساسية لفيتامين ب١ .

لا يجب استعمال نيوروفيت أمبول للأطفال حديثى

الولادة، وخاصة فى حالة الولادة المبترسة .

## الاستخدام فى الحمل، الرضاعة والأطفال:

ينصح بعدم إعطاء الحقن المحتوية على الكحول

البنزليلى للأطفال المبترسين، حديثى الولادة،

الأطفال أقل من ١٣ سنة، الحوامل أو المرضعات .

يمكن أن يؤدى الكحول البنزليلى الى آثار سلبية

خطيرة والوفاة وخاصة فى الأطفال ( يمكن أن

يسبب متلازمة الهاث)، لهذا يجب أن يكون  
المستحضر المستخدم خالى من المواد الحافظة .

## احتياطات الاستعمال:

لا توجد .

## التفاعلات مع الأدوية الأخرى:

المرضى الذين يعالجون بمستحضر (د - دوبا)

يجب ألا يأخذوا جرعات كبيرة من فيتامين ب١

وبالتالى من نيوروفيت، لأن فيتامين ب١ يضعف

مفعول (د - دوبا) .

## تحذيرات خاصة:

(إن هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعماله

خلاقا للتعليمات يعرضك للخطر .

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال

المخصوص عليها وتعليمات الصيدلى الذى

صرفها لك .

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة الطبيب .

- لا تترك الأدوية فى متناول الأطفال .

تحذيرات على المواد غير الفعالة (الكحول البنزليلى):

يحتوى هذا الدواء على الكحول البنزليلى الذى يكون

سام إذا تم حقنه موضعيا فى الأنسجة العصبية .

## الجرعة وطريقة الاستعمال:

يتم حقن نيوروفيت أمبول فى العضل .

فى الحالات الشديدة يتم حقن أمبولة واحدة يوميا

حتى يحدث تحسن فى الأعراض المرضية الحادة .

فى الحالات متوسطة الشدة أو فى حالات متابعة

العلاج يتم حقن ٢ أو ٣ أمبولات فى الأسبوع .

## مدة العلاج:

تحدد مدة العلاج بواسطة الطبيب .

## العبوة:

علبة تحتوى على ٣ أمبولات بكل منهم ٣ ملل +

نشرة داخلية .

## ظروف التخزين:

يحفظ فى درجة حرارة لا تزيد عن ٢٥ م .