

فاجي بروت

أقرص مهبلية ٢٥ ميكروجرام

أقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء في أخذ هذا الدواء.
- لا يصرف هذا الدواء إلا بوصفة طبية، وتحت إشراف طبي.
- هذا الدواء وصف لك وحده، لا تقم بإعطائه للآخرين، حيث أن استخدام هذا الدواء مقصود داخل المستشفيات ومراكز العلاج المختصة.
- احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية، اسأل الطبيب المختص.
- إذا زادت أي من تلك الآثار الجانبية خطورة، أو لاحظت وجود أية آثار جانبية غير تلك المذكورة في هذه النشرة، من فضلك أخبر الطبيب المختص.

- من المهم جدًا فهم المعلومات الواردة في القسم رقم ٣. كيف تأخذ فاجي بروت، وقبل تعاطي هذا الدواء.

في هذه النشرة:

١. ما هو فاجي بروت وفيما يستخدم.
٢. قبل تناول فاجي بروت.
٣. كيفية تناول فاجي بروت.
٤. الأعراض الجانبية المحتملة.
٥. التنبهات والتحذيرات.
٦. طرق حفظ وتخزين فاجي بروت.
٧. معلومات إضافية.

١. ما هو فاجي بروت وفيما يستخدم:

ما هو فاجي بروت؟

يحتوي فاجي بروت على مادة فعالة تسمى ميزوربوتول. الذي ينتمي لمجموعة من العقاقير تسمى مثائل البروستاجلاندين المخلقة E. يستخدم فاجي بروت في تحريض المخاض على نطاق واسع، وذلك لأن الميزوربوتول عندما يعطى عن طريق المهبل، يزيد من تليين عنق الرحم ويساعد على إتمام الولادة.

فعالية الميزوربوتول مثل فعالية دينوبروستون لتليين عنق الرحم والتحريض المسبق للولادة.

كما يتم استخدام الميزوربوتول للتحكم في النزيف المصاحب لما بعد الولادة.

فيما يستخدم فاجي بروت؟

تستخدم أقرص فاجي بروت المهبلية لتليين عنق الرحم وتحريض المخاض، وذلك عندما لا توجد موانع تخص الجنين أو الأم.

- في الثلاث شهور الأخيرة؛ يمكن استخدام أقرص فاجي بروت المهبلية بجرعات أكبر لتسهيل عنق الرحم قبل الإجهاض الجراحي والإجهاض والإفراغ محتويات الرحم في حالات وفاة الجنين أو تشوّه.

٢. قبل تعاطي فاجي بروت:

لا تأخذ فاجي بروت في حالة:

- إذا كنت أحد المرضى المحظور عمومًا باستخدامهم للعقار المعجّل والمحفّز للولادة
- أو في الحالات التي تعتبر تقلصات الرحم فيها لفترة طويلة غير مناسبة؛ مثل: حالات لها تاريخ سابق من الولادة القيصرية أو جراحة رأسيّة بالرحم
- الحالات التي بها درجة كبيرة من عدم تناسب رأس الجنين لحوض الأم
- الحالات التي بها إشتهاء أو دليل على تدهور صحة الجنين؛
- في الحالات التي لها تاريخ طويل من الولادة الصعبة و / أو الولادة المؤلمة؛

ذرات الحمل لأكثر من ٦ مرات؛

- المرضى الذين لديهم حساسية طبيعية للبروستاجلاندين؛

- الربو الشعبي الحاد أو أمراض القلب نشطة؛

- تمزق الأغشية؛

- زريف مهبل غير مقصر في المرحلة الثالثة من الحمل؛

- تاريخ سابق من الإصابة بالماه الزرقاء؛

- الإتهاب الفيروسي الجذبي (الهربس).

إذا عانيت من أي من تلك الحالات، تحدث مع الطبيب المختص أولاً واتم بساخه.

تعاطي أدوية أخرى:

وجد أن البروستاجلاندين يعزز تأثير الأوكسيتوسين، فمن المستحسن أن إذا تم استخدام هذه الأدوية معًا، أن يتم رصد نشاط وفتحياضات رحم المرضية بعناية.

الحمل والرضاعة:

الحمل المبكر: التعرض لميزوربوتول في مرحلة مبكرة من الحمل قد يؤدي إلى أجنة بعيوب خلقية متعددة، ومع ذلك، فقد كانت الدراسات الخاصة بالتشوّهات للميزوربوتول لم تثبت أنه مشوه للأجنة، أو سام للجنين. وبالتالي هذه التشوهات، قد تكون ناتجة من اضطراب في تدفق الدم إلى الجنين خلال الإفتحياضات بفعل الميزوربوتول.

ويقدر أن مخاطر حدوث التشوهات بعد التعرض للميزوربوتول منخفض نسبيًا، في حدود ١% من الأجنة التي تتعرض له.

من المهم أن يكون لديك موافقة مسبقة من قبل المريض

لمعمل الإجهاض وكذا الإفراغ، بخطر حدوث تشوهات للجنين إذا استمر الحمل بعد التعرض للميزوربوتول.

الأمهات المرضعات: يمكن إعطاء الميزوربوتول للأمهات المرضعات للوقاية والعلاج من زريف ما بعد الولادة. وإذا فن

عمل النظر في آثارها المحتملة على الجنين. لا توجد بيانات على تسرب الميزوربوتول في حليب الثدي إذا تم استخدامه عن طريق غير الدم. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تركز حليب

الثدي سيكون أقل في حالة أخذ الميزوربوتول عن طريق المهبل من تركيزه في حالة تناوله بالفم، ولكن قد يستمر لفترة أطول. هذا وتأثير التعرض المؤقت لمستويات منخفضة من الميزوربوتول على الجنين غير معروف.

٣. كيف تأخذ فاجي بروت:

خذ قرص واحد من فاجي بروت مرة أسبوعيًا.

اتبع هذه التعليمات بعناية للتأكد من أنك ستستفيد من فاجي بروت.

إذا أخذت فاجي بروت أكثر مما يجب:

نادراً ما قد يحدث تقلصات شديدة بالرحم، بسبب الجرعة الزائدة. عندما يكون هناك دليل على تدهور حالة المريض أو فرط توتري لمعضلة الرحم، فإنه ينبغي إجراء الولادة التوريق.

٤. الآثار الجانبية المحتملة:

- كما هو الحال مع جميع الأدوية التي تحتوى على البروستاجلاندين، فإن الأعراض الأكثر شيوعاً هي الغثان والتقيؤ والإسهال، الآثار الجانبية الأخرى فرط الحساسية للعقاقير، تمزق الرحم والسكتة القلبية.

- آثار الجانبية أخرى ذكرت مع تناول البروستاجلاندين في ترتيب تنازلي من حيث الخطورة هي: الإسداد الرئوي في حديثي الولادة، فرط توتري لمعضلة الرحم أو تقلصات شديدة بالرحم، الضائقة الجنينية وارتفاع ضغط الدم، تشنج قسبي / الربو، وحصى والأم الظهر والطفح الجلدي.

- وقد شملت الآثار الضارة التي شوهدت مع استخدام البروستاجلاندين في تحريض المخاض: تقلصات شديدة بالرحم مع بطء في نبضات الجنين مع انخفاض مؤشر أجد لحديث الولادة.

- ميزوربوتول هو دواء آمن وجيد التحمل. تشير الدراسات ما قبل السريرية أن هامش السلامة على الأمل بين ٥٠٠ - ١٠٠٠ ضعف الجرعات القاتلة في الحيوانات والجرعات العلاجية في البشر.

- لا توجد آثار ضارة واضحة سريريًا مع استخدام الميزوربوتول في: الدم، والغدد الصماء، المناعة،

البروكيميا، والجهاز التنفسي، الآثار البصرية، وآثار الصفائح الدموية أو القلب والأوعية الدموية.

- الإسهال هو أثر سلبي كبير وواضح باستمرار مع استخدام الميزوربوتول، ولكنه عادة خفيف ومحدود ذاتيًا. قد يحدث

الغثان والقيء، وأيضاً يتم معالجتهم وزولهم في فترة زمنية من ٢ إلى ٦ ساعات.

- الجرعة السامة من الميزوربوتول غير معروفة، ولكنه يعتبر دواء آمن جدًا. الحمى والقشعريرة شائعين الحدوث مع جرعات الحمل في المرحلة الثالثة من الحمل أو فترة ما بعد الولادة مباشرة. الحالة النموذجية التي يلاحظ فيها هذا هو

عندما يتم استخدام الميزوربوتول للوقاية أو العلاج من النزيف بعد الولادة.

إذا زادت أي من تلك الآثار الجانبية خطورة، أو لاحظت وجود أية آثار جانبية غير تلك المذكورة في هذه النشرة، من فضلك أخبر الطبيب المختص.

٥. التنبهات والتحذيرات:

- هذا المنتج متوفر فقط في المستشفى والعيادات المزودة بخدمات متخصصة للولادة، ويجب استخدامه فقط حيث يتم توفير تغطية طبية لمدة ٢٤ ساعة للمقيم.

- كما هو الحال مع غيره من العوامل المحفزة للولادة، يجب استخدام أقرص فاجي بروت المهبلية بحذر في المرضى الذين يعانون من خطر بالرحم و / أو تمزق الأغشية.

- في تحريض المخاض، ينبغي أن يتم تقييم نسبة رأس الجنين إلى اتساع حوض الأم قبل استخدام البروستاجلاندين E.

- أثناء الاستخدام، ينبغي مراقبة نشاط الرحم، ووضع الجنين وتطور توسع عنق الرحم بعناية للكشف عن الأسباب الممكنة للأثر غير مرغوب فيها، على سبيل المثال فرط توتري لمعضلة الرحم أو تقلصات شديدة بالرحم، والضائقة الجنينية.

- وفي الحالات التي لا يوجد لها تاريخ معروف من فرط توتري لمعضلة الرحم أو تقلصات شديدة بالرحم، فمن المستحسن أن يتم مراقبة نشطة لنشاط الرحم وحالة الجنين طوال عملية الولادة وينبغي توخي الحذر في إمكانية تمزق الرحم حيث تكون تقلصات الرحم بدرجة عالية ومستمرة.

- ينبغي توخي الحذر في استخدام البروستاجلاندين E في المرضى الذين يعانون من: الربو، الصرع أو تاريخ من الصرع، والمياه الزرقاء أو ارتفاع ضغط العين، شبيهة خطورة في القلب والأوعية الدموية والكبد، أو وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم.

٦. كيف تخزن فاجي بروت:

احفظ الأقرص بعيداً عن متناول ومراى الأطفال.

لا تستخدم أقرص فاجي بروت بعد مرور تاريخ الصلاحية المدون على العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى آخر يوم من ذلك الشهر.

لا يحتاج هذا المنتج لطرفو خاصة للتخزين. لا تتزعج الأقرص من شريط العبوة حتى تكون جاهزاً لأخذ الدواء.

يخزن هذا الدواء عند درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية وبعداً عن الضوء المباشر.

لا يجب التخلص من الأدوية في مياه المجاري أو نفايات المستشفى. اسأل مسئولو حماية البيئة بالمستشفى كيف تتخلص من الأدوية التي لا تحتاجها. ستساعد تلك الإجراءات على حماية البيئة.

٧. معلومات إضافية:

ماذا يحتوي فاجي بروت؟

المادة الفعالة:

المادة الفعالة هي ميزوربوتول.

تحتوي أقرص فاجي بروت على ٢٥ ميكروجرام ميزوربوتول.

المكونات الأخرى:

مانيتول دي سي، ميكروكريستالين سيلولوز، ميثانثاني سلفات الصوديوم، إديتا ثنائي الصوديوم، بولي بلاسيدون أكس ل، جليكولات الصوديوم، نشاء، ثنائي أكسيد السيليكا وستيرات الماغنسيوم.

كيف يبدو فاجي بروت ومحتوى العبوة:

أقرص فاجي بروت المهبلية بيضاء مستطيلة تغلف الأقرص في عبوة كرتونية بها شريط من (الومنيوم/ بي في سي) يحتوي على ٤ أقرص ونشرة داخلية.

كيف يمكنك الحصول على معلومات أكثر عن فاجي بروت؟

تعليمك هذه النشرة المعلومات الأكثر أهمية عن فاجي بروت بالنسبة للمريض. إذا كانت لديك أية أسئلة بعد قراءتها، اسأل الطبيب المعالج الذي سيعطيك معلومات إضافية.

احفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

إنتاج: شركة أدوية ش.م.م.
مدينة العاشر من رمضان - مصر