

Team

For further information, please

Whatsapp us

+2 0106 128 23 86

التركيب :

كل قرص يحتوي على :

ميزوبروستول (١%) ٢٠ ملليجرام

يكافئ ٢٠٠ ميكروجرام ميزوبروستول ١٠٠ %

الخواص :

ميزوبروستول هو مركب مشيد مناظر للبروستاجلاندين E₁ ويستعمل في علاج والوقاية من قرح المعدة والأمعاء وعلي الأخص تلك التي تحدث نتيجة إستعمال عقاقير مضادات الإلتهاب الغير سترويدية ميزوبروست (ميزوبروستول) يمنع إفراز العصارة المعدية الحامضية وله خاصية وقاية الغشاء المخاطي المبطن للمعدة والقناة الهضمية .

عند تناول أدوية مضادات الإلتهاب الغير سترويدية فان تلك الأدوية تمنع تكوين البروستاجلاندين الذي عندما ينقص بالغشاء المخاطي المبطن للمعدة فإنه يسبب نقص البيكربونات والإفرازات المخاطية وبالتالي يلحق الضرر بالغشاء المخاطي المعدى . وعند إستعمال ميزوبروست فإنه يعمل على زيادة البيكربونات والإفرازات المخاطية مع منع الإفراز الحامضى المعدى .

وميزوبروست يستعمل أساساً للوقاية من القرح المعدية التي تنتج عند إستعمال مضادات الإلتهاب الغير سترويدية.

دواعى الاستعمال :

منع قرح المعدة التي يسببها إستعمال أدوية مضادات الإلتهاب الغير سترويدية وذلك لدى المرضى المعرضين للمضاعفات بسبب هذه القرح وكذلك المرضى المعروف أن لهم سوابق فى تكوين هذه القرح . ويجب إستعمال ميزوبروست طوال مدة العلاج بمضادات الإلتهاب الغير سترويدية .

نواهي الإستعمال :

- الحساسية للبروستاجلاندين
- حالات الحمل أو توقع حدوثه .

الإحتياطات والتحذيرات :

لا يجب إستعمال ميزوبروست للحوامل بأي حال من الأحوال . أو فى حالات إمكان حدوث حمل مستقبلاً ومع الضرورة القصوى التي تحتتم إستعمال ميزوبروست يجب التحذير بمراجعة عدم الحمل أثناء إستعمال العقار مع إستعمال موانع حمل أكيدة .

الجرعة وطريقة الإستعمال :

للوقاية من القرح التي يسببها إستعمال أدوية مضادات الإلتهاب الغير سترويدية فإن الجرعة للكبار هي ٢٠٠ ميكروجرام (قرص واحد) أربع مرات يومياً آخرها قبل النوم . ويجب أخذ ميزوبروست أثناء الأكل وطوال مدة إستعمال أدوية مضادات الإلتهاب الغير سترويدية . وفى الحالات التي لا تحتتم هذه الجرعة يمكن إستعمال جرعة ١٠٠ ميكروجرام (نصف قرص) .

طريقة التخزين :

يحفظ عند درجة حرارة الغرفة بعيداً عن الضوء والرطوبة .

العبوة :

علبة كرتون تحتوي على ٢ شريط بي فى سي / ألومنيوم بكل منها عشرة أقراص ونشرة داخلية .